



I L L I N O I S

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

PRODUCTION NOTE

University of Illinois at
Urbana-Champaign Library
Brittle Books Project, 2011.

COPYRIGHT NOTIFICATION

In Copyright.

Reproduced according to U.S. copyright law USC 17 section 107.

Contact dcc@library.uiuc.edu for more information.


This digital copy was made from the printed version held
by the University of Illinois at Urbana-Champaign.
It was made in compliance with copyright law.

Prepared for the Brittle Books Project,
Preservation Department, Main Library,
University of Illinois at Urbana-Champaign

by

Northern Micrographics
Brookhaven Bindery
La Crosse, Wisconsin

2011



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

MÉLANGES

EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

CINQUANTE-DEUXIÈME FASCICULE

(10 septembre 1928)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHEN, 15

—
1928

Tous droits réservés

Natural History Library

595.76

P58m

pt. 52

Nouveautés diverses ⁽¹⁾

Scaphidiolum rufonotatum n. sp. Oblongus, nitidus, niger, thorace pro majore parte elytrisque disco rufis, articulo ultimo antennarum tarsisque rufis; oculis sat approximatis; thorace elongato, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris in disco minute et sparse punctatis. Long. 7-8 mill. Annam: Dalat. — Espèce très distincte par sa coloration. A placer près de *rufipes* Pic.

S. lateflavum n. sp. Oblongus, nitidus, niger, abdomine pro parte pedibusque testaceis, elytris ad basim late et postice minute flavo-testaceo notatis; antennis gracilibus; oculis sat approximatis; thorace elongato, antice attenuato, fere impunctato; elytris in disco fortiter multi lineato-punctatis, apice irregulariter punctatis. Long. 7 mill. Dalat. — Voisin du précédent, coloration et ponctuation élytrale différentes.

S. Salvazai n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, elytris antice et postice sinuate rufo-fasciatis, fascia postica reducta, prima suturam non attingenta; oculis approximatis; thorace elongato, antice attenuato, minute et sparse punctato; elytris in disco diverse sed non fortiter punctatis. Long. 6 mill. N. Mo (ex Vitalis).

S. laosense n. sp. Subovatus, nitidus, niger, elytris antice et postice rufo undulato-fasciatis, capite antice antennisque ad basin rufis; oculis sat approximatis; thorace parum elongato, antice valde attenuato, minutissime punctato; elytris in disco minute et irregulariter punctatis. Long. 5 mill. Laos. — Voisin de *unifasciatum* Pic.

(1) Les types des nouveautés de ce fascicule figurent dans ma collection.

en diffère, à première vue, par la présence aux élytres d'une fascie antéapicale.

Le **S. dalatense** mihi, de l'Annam, voisin du précédent, est un peu plus allongé, le prothorax et les élytres sont plus nettement ponctués et les fascies claires des élytres se joignent, par la présence de bandes longitudinales supplémentaires extérieurement et intérieurement, la tête est entièrement noire et les yeux sont plus rapprochés.

Nosodendron irregulare n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, subconvexus, hirsutus, fortiter, sparse et irregulariter punctatus, niger, clava antennarum testacea. Long. 5 mill. Indochine. — Espèce voisine de *unicolor* Say, plus rétrécie aux extrémités, ponctuation de la tête plus écartée, etc.

Syncalypta impressipennis n. sp. Subovatus, opacus, niger, griseo luteo squamosus et setis latis hirsutus ; thorace breve, antice valde attenuato et paulo strangulato ; elytris latis, postice longe attenuatis, ad suturam postice distincte sulcatis et impressis, pro parte substriatis. Long. 3 mill. Laos. — Espèce très distincte par sa taille relativement grande et ses élytres nettement impressionnés et sillonnés postérieurement.

Macrobyrrhinus laosensis n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, fere opacus, holosericeo pubescens, elytris pro parte denudatis, niger, antennis tarsisque rufis ; capite thoracéque sat minute et dense punctatis ; elytris sat fortiter et pro parte regulariter punctatis, externe paulo explanatis. Long. 5 mill. Laos. — Voisin de *maculosus* Pic, distinct, à première vue, par la ponctuation moins profonde des élytres et l'aspect moins brillant.

Pseudochelonarium subovatum n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, griseo pubescens, supra disperse et minute albo-maculatus, rufus, capite obscuriore, elytris nigro-piceis. Long. 4 mill. environ. Sumatra. — Très distinct de *hirsutum* Pic, par sa forme plus trapue, son prothorax plus rétréci en avant et les mouchetures espacées des élytres.

Paroplapoderus multicostatus n. sp. Robustus, elytris minute et multicostatis, ingibbosis, rufus, pectore, capite thoraceque nigro maculatis, elytris rufis, ad basin et ad medium nigro fasciatis, ante apicem nigro maculatis et apice testaceo marginatis, membris, abdomine pygidioque testaceis et immaculatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce caractérisée par sa particulière coloration, jointe à ses élytres multicostés. A placer près de *melanostichus* Frm.

Tomapoderus testaceimembris n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, rufo-testaceus, pectore thoraceque nigris, elytris nigro cœruleis, his latis et brevibus, pro parte et diverse lineato-punctatis, externe carinatis, humeris dentatis; thorace sat lato et breve, antice attenuato, pro parte plicato, medio sulcatulo. Variat: capite inter oculos nigro maculato (v. nov. **maculaticeps**), aut antennis piceis, ad basim testaceis et thorace cœrulescente (v. nov. **diversicornis**). Long. 7-8 mill. Chine, Tonkin. — Voisin de *subconicicollis* Voss., en diffère par le prothorax assez large, la poitrine toute noire, les côtés de la tête non marqués de foncé.

Phymatopoderus monstrosus n. sp. Robustus, nitidus, inæqualis, pro parte rufo-testaceus, pro parte piceus, infra corpore nigro, abdomine testaceo et nigro notato; membris testaceis, femoribus brunneo annulatis; capite medio sulcato, testaceo, inter oculos nigro; thora-

ce breve et lato, inæquale ;elytris latis et brevibus, inæqualibus, pro parte foveolatis aut plicatis, in disco antice diverse bigibbosis, humeris angulatis, diverse coloratis ; pygidio testaceo, nigro bimaculato. Long. 9 mill. Chine : Chang-Hai. — Espèce des plus distinctes par sa sculpture irrégulière.

Cis ciliatus n. sp. Grandis, elongatus, subparallelus, nitidus, rufus, holosericeo pubescens, supra pro parte denudatus ; antennis 10 articulatis, articulo 3° longissimo, 5-7 brevibus, clava triarticulata, elongata ; thorace sat elongato et robusto, antice crenato et ciliato, supra inæquale, medio sulcatulo, pro parte minute, pro parte fortiter et sparse punctato ; elytris dense et minute punctatis, punctis fortioribus diverse dispositis, munitis. Long. 5 mill. Dalat. — Espèce distincte entre toutes par sa grande taille jointe à son revêtement non continu.

Xenoreoderus ater n. sp. Minutus, parum elongatus, nitidus, niger, sparse albo squamosus, squamulis in elytris regulariter et lineato dispositis ; thorace incarinato. Aliquot elytris late rufis (v. **bicolor**). Long. 4 mill. Tonkin. — Voisin de *humilis* Gestro et distinct par la disposition particulière des squamules sur les élytres.

Podovalgus brevicarinatus n. sp. Sat elongatus, parum nitidus, rufo-brunneus, dense luteo aut griseo squamosus, squamulis in elytris parum dense et irregulariter dispositis ; carinis thoracis postice obliteratis. Long. 9 mill. Tonkin. — Distinct, à première vue, de *griseus* Ar., par la forme plus étroite et les carènes raccourcies du prothorax.

Le **Dasyvalgus pubicollis** mihi, du Thibet, très voisin de *Savioi* Pic (non *Valgus* Sc.) et de coloration analogue, en diffère par le prothorax moins large, très densé-

ment squamuleux, avec les tubercules fasciculés du propygidium plus écartés.

Phaeochrous intermedius n. sp. Oblongus, parum nitidus, nigro-piceus, capite antice, thorace antice et lateraliter diverse et elytris pro parte rufo marginatis, membris et infra corpore rufo-pallidioribus ; capite thoraceque minute diverse et sparse punctatis, illo lateraliter valde deplanato et pro parte fortiter punctato; elytris sat latis, plus minusve brevibus, dense striato-punctatis, apice irregulariter punctatis ; ♂ forcipis lobo dextro grande dentatiforme, sinistro sat lato, fere spatuliforme. Long. 10 mill. Tonkin. — Plus grand et plus robuste que *ruficollis* Frm., avec le prothorax à marge autrement ponctuée.

Le **P. diversipes** mihi, des Indes, très voisin du précédent, s'en distingue par la ponctuation plus rapprochée de la marge réfléchie du prothorax, les stries des élytres un peu plus marquées et régulières, les tibias en partie et les tarsi obscurcis, avec les tibias bidentés au lieu d'être tridentés.

P. rufus n. sp. Oblongo-elongatus, postice paulo dilatatus, parum nitidus, concolor, rufo-pallidus ; capite minute et sparse punctato ; thorace sparse et inæquale punctato, lateraliter valde deplanato et fortiter punctato; elytris diverse striato-punctatis, ad suturam distincte gibbulosis et impressis ; tibiis anticis late tri dentatis, ad basim subcrenulatis. Long. 5 mill. Chine. — Diffère de *Davidi* Frm. par la coloration plus claire, la ponctuation très espacée du prothorax, la forme élytrale.

P. celebensis n. sp. Oblongo-subovatus, parum nitidus, rufo-testaceus, supra rufus, capite postice thoraceque in medio brunneis ; capite sat dense punctato ; tho-

race diverse sat dense, lateraliter fortiore, punctato ; elytris latis et brevibus, dense striato-punctatis, apice irregulariter punctatis, ad suturam postice parum distincte gibbulosis sed non impressis ; tibiis anticis trispinosis et multi crenulatis. Long. 10 mill. Célèbes. — Bien plus large que le précédent, avec les élytres différents et l'avant-corps en partie rembruni.

La var. nov. **ruficeps** mihi, de la Nouvelle-Guinée, a la tête rousse, le prothorax moins large, est presque entièrement noir de poix et plus droit postérieurement, les élytres sont plus pâles.

P. Benderitteri n. sp. Oblongus, parum nitidus, diverse rufus, aliquot supra pro parte castaneus ; capite minute et sparse punctato ; thorace inæquale et sparse punctato, lateraliter fortiore ; elytris sat brevibus, sat dense striato-punctatis, apice irregulariter punctatis ; tibiis anticis tridentatis, et multi crenulatis. Long. 12-13 mill. Ho Waigeu. — Voisin de *philippinensis* West., moins foncé, côtés du prothorax moins élargis et plus droits en arrière, stries élytrales plus régulières.

Amphisternus sordidus (Arrow.). Oblongus, parum nitidus, niger ; thorace valde transverso, inæquale et pro parte noduloso, postice longitudinaliter trisulcato, lateraliter antice arcuate dilatato ; scutello globuloso, nitido ; elytris latis et brevibus, antice et in disco cristatis aut diverse tuberculatis, fortiter et irregulariter punctatis. Long. 7 mill. Dalat (ex Vitalis). — Espèce voisine de *laotianus* Ach., par les élytres concolores, ornées de 2 rangées antérieures de crêtes émoussées ou de petits tubercules tous foncés avec une arête humérale sinuée, l'écusson globuleux et brillant.

Engonius dalatensis n. sp. Oblongus, sat latus, niti-

dus, niger, elytris post humeros et post medium luteo transverse-maculatis, clava antennarum lata ; capite minute punctato ; thorace breve et lato, parum minute et sparse punctato, lateraliter subsinuato, angulis prominulis ; elytris parum elongatis, lateraliter subarcuatis, apice attenuatis, paulo marginatis, sat fortiter et parum dense punctatis, punctis postice minutis. Long. 8 mill. Dalat (ex Vitalis). — Sans doute voisin de *similis* Arrow., il paraît en différer au moins par le prothorax plus transversal et la forme moins allongée.

Tomoderus (Pseudotomoderus) testaceus n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens et hirsutus, testaceus, capite postice subarcuato, parum punctato ; antennis sat elongatis, apice dilatatis, articulo ultimo longe acuminato ; thorace parum breve, antice valde dilatato, distincte punctato, medio sulcato ; elytris thorace sat latioribus, elongatis, parallelis, sat regulariter non dense punctatis, punctis postice minutis ; pedibus parum gracilibus. Long. 3 mill. Tonkin : Hoa Binh. — Voisin de *javanus* Pic, antennes moins épaisses, prothorax moins courtement étranglé, etc.

Hemicera elongatior n. sp. Elongatus et angustatus, antice et postice attenuatus, æneus, supra pro parte purpureo et viride tinctus, antennis nigris ; capite minute et sparse punctato ; thorace breve sat lato, minute pro parte sparse punctato ; elytris elongatis, minute striato-punctatis, intervallis pro parte explanatis. Long. 7 mill. Tonkin. — Voisin de *auratocollis* Pic, plus allongé et de coloration différente.

Chariotheca viridipennis n. sp. Elongatus, nitidus, rufescens, antennis testaceis, elytris viridibus, cyaneo limbatis, capite thoraceque fortiter parum dense punctatis, illo parum lato, antice paulo dilatato, postice fere recto ;

elytris thorace paulo latioribus, paulo striatis et diverse punctato-lineatis, intervallis deplanatis, parum punctatis. Long. 4,5 mill. Tonkin. — Voisin de *semipurpureus* Pic, plus étroit et coloration différente.

C. curta n. sp. Oblongus, sat latus, nitidus, rufus, supra cyaneo-violaceo metallicus ; capite thoraceque fortiter sat dense punctatis, illo breve et valde transverso, lateraliter subarcuato, angulis anticis prominulis ; elytris thorace paulo latioribus, brevibus, apice attenuatis, humeris distinctis, minute striato-punctatis, intervallis multi et minute punctatis. Long. 4 mill. Sumatra. — Espèce très distincte par sa forme trapue, jointe à sa coloration.

C. Whanesi n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, rufescens, supra viridi-cyaneus ; capite minute et sparse punctato ; thorace breve et lato, lateraliter fere recto, angulis anticis rotundatis ; elytris thorace non latioribus, elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, parum punctatis. Long. 5 mill. Bornéo. — Plus allongé que le précédent, prothorax différent, etc.

C. cyanea n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, supra cyaneus, antennis femoribusque ad basim rufis ; capite inæquale punctato ; thorace breve et lato, lateraliter undulato, sat fortiter et sparse punctato, angulis anticis externe productis ; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, sparse punctatis. Long. 5 mill. Bornéo. — Voisin de *arcuatipes* Pic, en diffère par les pattes plus robustes et bicolores, les points des stries élytrales plus petits.

Eucyrtus malanganus n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, capite cyaneo, antice rufo, thorace rufo-violaceo, elytris cyaneo-violaceis ; capite dense ruguloso-punctato ; tho-

race breve et lato, lateraliter subundulato, fortiter et dense punctato, angulis anticis rotundatis ; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice attenuatis, striato-punctatis, intervallis sparse punctatis. Long. 7 mill. Java. — A placer près de *piceicornis* Frm.

E. cyaneithorax n. sp. Elongatus, nitidus, niger, capite postice thoraceque cyaneis, illo parum lato, lateraliter medio minute tuberculato, parum fortiter sat sparse punctato ; elytris viridibus, thorace valde latioribus, postice attenuatis, fortiter punctato-striatis, intervallis convexis ; pedibus gracilibus. Long. 8 mill. Bornéo. — Espèce distincte par la structure de son prothorax jointe à sa coloration.

Pseudamarigmus Dohertyi v. nov. **bruneiensis**. Rufescens, supra late æneus, elytris parum elongatis, distincte punctatis. Bornéo. — Paraît différer de la forme type par la coloration plus uniforme et la ponctuation élytrale plus forte.

P. javanicus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufus, capite postice, thorace elytrisque nigro-subæneis, epipleuris rufis ; thorace breve, antice attenuato, minute punctato ; elytris postice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis minute et sparse punctatis. Long. 4 mill. Java. — Voisin de *testaceipes* Pic, élytres de forme plus parallèle, à intervalles plus éparsément ponctués.

Rehumius laticollis n. sp. Subovatus, nitidus, sat convexus, niger ; capite diverse pro parte fortiter punctato ; thorace latissimo ; elytris valde latiore, lateraliter arcuato, sat minute et dense punctato ; elytris brevibus, apice obtusis, fortiter striatis, intervallis convexis, fere impunctatis. Long. 7 mill. Laos. — Paraît différer de

amplithorax Frm., au moins par la tête autrement ponctuée, le dessous du corps pas plus brillant que le dessus.

Microsphaerotus n. gen. Très voisin de *Sphaerotus* Kirby par son faciès et divers caractères généraux, en diffère, à première vue, en outre de sa petite taille et des élytres plus courts, par ces organes nettement rebordés sur les côtés de la base, à arête latérale très distincte, avec les épipleures surélevés vers l'extrémité. L'épistome est limité par un sillon profond, nettement arqué, les antennes sont à peine épaissies à l'extrémité, grêles, avec tous les articles nettement plus longs que larges. Genre établi pour l'espèce suivante :

Microsphaerotus ruficornis n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, rufescens, supra nigro-piceus, elytris subaeneis ; capite parum fortiter sat dense punctato ; thorace parum transverso, lateraliter fere recto, angulis anticis prominulis, ad basim marginato, minute sat sparse punctato ; elytris ad medium valde dilatatis et convexis, ad basim paulo strangulatis, apice subacuminatis, substriatis et lineato punctatis, punctis pro parte latis et foveolatis ; pedibus elongatis, rufis, geniculis piceis. Long. 7 mill. Dalat (ex Vitalis).

Basanus presuturalis n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris antice luteo undulato-fasciatis et ante apicem ad suturam luteo notatis, his striato-punctatis, intervallis multi punctatis. Long. 8 mill. Laos (ex Vitalis). — Distinct, à première vue, de *javanus* Chev. par la position présuturale de la macule postérieure claire des élytres.

Basides marginatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, antennis ad basim rufis, thorace lateraliter rufo-notato, elytris antice luteo fasciatis et postice luteo maculatis ; capite diverse medio postice fortiore punc-

tato, oculis distantibus ; thorace breve et lato, antice angustiore, lateraliter valde marginato, mediocre et sparse punctato ; elytris elongatis, postice attenuatis, marginatis, minute striato-punctatis, intervallis latis, deplanatis, minute punctatis. Long. 8 mill. Annam. — Espèce très distincte par son prothorax nettement et largement rebordé, puis largement bimaçulé de roux.

Praogena bicoloripes n. sp. Parum elongatus, nitidus, rufo-viridescens, supra æneus, antennis nigris, articulo 1^o testaceo, pedibus testaceis, femoribus apice, tibiis ad basim tarsisque nigris ; capite thoraceque fortiter sat dense punctatis, illo transverso ; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, fortiter striato-punctatis, intervallis subcarinatis. Long. 13 mill. Sierra-Leone. — Sans doute voisin de *æneola* Qued., en diffère au moins par la coloration particulière des pattes.

P. basipes n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-æneus, infra corpore pro parte rufescente, elytris purpureis, membris nigris, femoribus ad basin rufis ; thorace breve sat lato, mediocre sat dense punctato ; elytris thorace sat fortiter striato-punctatis, intervallis costulatis. Long. 15 mill. Côte-d'Ivoire. — Voisin de *rutilia* Frm., plus étroit, avec les pattes plus foncées, les intervalles surélevés.

P. violaceipennis n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, elytris violaceis ; capite thoraceque minute sat sparse punctato, illo parum lato, subgloboso ; elytris mediocre striato-punctatis, intervallis convexis, sat angustatis. Long. 14 mill. Afrique Or. — Peut se placer près de *cylindrica* Mak.

P. punctata n. sp. Elongatus, nitidus, niger, elytris violaceo purpureis, his fere instriatis sed lineato-punc-

tatis, intervallis sat latis, depressis, minute et multi-punctatis ; thorace paulo transverso, fortiter parum dense punctato. Long. 15 mill. Côte-d'Ivoire. — Voisin du précédent et distinct, à première vue, de la plupart des espèces, par les élytres à peine striés, mais plutôt ponctués en rangées.

Asclera dalatensis n. sp. Opacus, supra densissime ruguloso-punctatus, olivaceus, capite membrisque nigris aut paulo cyaneis, thorace rubro, postice testaceo marginato, sat fortiter biimpresso. Long. 9 mill. Annam. — Très voisin de *griseicornis* Pic, mais moins large, prothorax opaque et densément ponctué, etc.

Copodita saigonensis n. sp. Elongatus, opacus, griseo pubescens, minute et dense punctatus, rufus, antennis pedibusque pro parte pallidioribus ; thorace elongato, antice paulo dilatato, biimpresso ; elytris minute costatis. Long. 13 mill. Saïgon. — Peut se placer près de *longissima* Pic, mais prothorax plus allongé, tête non foncée, aspect mat.

Glipa vittatipennis n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, griseo pubescens, niger, pro parte viridescens, palpis antennisque ad basin rufis, elytris in disco longitudinaliter luteo-fulvo vittatis, his signaturis griseis indistincte ornatis. Long. 6 mill. Tonkin. — A placer près de *formosana* Pic.

Mordella luteomaculata n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, opacus, niger, signaturis luteis ornatus, elytris in singulo luteo 4-maculatis ; pygidio longissimo. Long. 7 mill. Tonkin : Hoa Binh. — Dessins analogues à ceux de *lacsonensis* Pic, mais jaunes au lieu d'être blancs.

M. bistrinotata n. sp. Parum elongatus, postice paulo

attenuatus, nitidus, niger, pro parte griseo pubescens, antennis ad basin testaceis, elytris in singulo antice oblique luteo bimaculatis et post medium in disco luteo maculatis ; pygidio elongato. Long. 5 mill. Hoa Binh. — A placer près de *flavimana* Mars.

M. binhana n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, nitidus, niger, uniformiter griseo-fulvo pubescens, scutello pubescente ; pygidio elongato. Long. 6 mill. Tonkin. — Plus trapu sur l'avant-corps et de forme moins élancée que *postimpressa* Pic.

M. geniculata n. sp. Angustatus, pro parte holosericeo pubescens, nigro-iridescens, antennis pedibusque 4 anticis pro parte et geniculis posticis testaceis ; elytris antice et postice griseo undulato-fasciatis ; pygidio sat elongato et angustato. Long. 5 mill. Hoa Binh. — A placer près de *flavimana* Mars.

M. 4-maculata n. sp. Angustatus, postice attenuatus, subnitidus, niger, antennis, capite, thorace, abdomine apice pygidioque rubris, pedibus anticis testaceis, elytris nigris, ad humeros et post medium testaceo maculatis ; pygidio angustato. Long. 4 mill. Bornéo. — Espèce très distincte par sa coloration ; peut se placer près de *longevittata* Pic.

Mordellistena trinotata n. sp. Sat angustatus, nitidus, testaceus, antennis apice, abdomine elytris nigris, his antice in disco testaceo lineatis et postice ad suturam testaceo maculatis ; pygidio longissimo, angustato ; tibiis posticis validis, trisulcatis. Long. 3-4 mill. Hoa-Binh. — Moins gracile que *4-notata* Pic, avec les pattes postérieures plus fortes, le pygidium plus long.

M. triangularis n. sp. Angustatus, subparallelus, nitidus, niger, capite antice, antennis ad basim, infra cor-

pore et pedibus pro parte thoraceque, illo medio brunnescente, rufis ; elytris nigris, ad basin reducte et ante apicem late testaceo fasciatus, antice in disco testaceo maculatis ; pygidio longissimo, angustato. Long. 4 mill. Bornéo. — Espèce très distincte par sa coloration, jointe à sa forme subparallèle.

M. quadrinotatipennis n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, antennis ad basim et pedibus anticis testaceis ; elytris nigris, ad humeros testaceo notatis et postice reducte testaceo-griseo fasciatis ; pygidio parum breve. Long. 3,5 mill. Bornéo. — A placer près de *subfasciata* Pic.

Le **M. bruneiensis** mihi, de la même origine, offre une coloration analogue, mais la forme est un peu plus allongée, les élytres très atténués postérieurement et le pygidium plus long. Parfois le prothorax est un peu roux (v. nov. *rufithorax*).

Cistelopsis minuta n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, luteo pubescens, rufus, capite piceo ; capite fortiter et sparse punctato, oculis sat distantibus ; antennis sat gracilibus ; thorace breve, antice arcuato, fortiter non dense punctato, postice biimpresso ; elytris sat elongatis, substriatis et subcostulatis, lineato-punctatis. Long. 4,5 mill. Hoa Binh. — Voisin de *tonkinea* Pic, moins allongé et coloration plus claire.

Borboresthes bicoloricornis n. sp. Parum elongatus, nitidus, luteo pubescens, niger, élytris abdomineque rufescentibus, membris luteis, antennis ad basim femoribusque pro parte obscuris ; thorace dense punctato ; elytris striato-punctatis, intervallis subconvexis, multi punctatis. Long. 10 mill. Tonkin : Lac Tho. — Voisin de *subfasciatus* Pic, élytres plus larges et à peu près con-

colores, prothorax plus fortement et plus densément ponctué.

B. castaneus n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, castaneus, pro parte obscurior, antennis tarsisque testaceis ; thorace minute sat dense punctato ; elytris striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute punctatis. Long. 9 mill. Chine : Yunnan Fou. — A placer près de *subsulcatus* Pic.

Le **B. testaceimembris** mihi, du Tonkin, noir avec les membres testacés, diffère du précédent par son prothorax plus régulièrement arqué, à ponctuation plus dense, les élytres à points des stries plus gros.

B. convexus n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, tarsi testaceis ; thorace sat dense punctato ; elytris convexis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute punctatis. Long. 13 mill. Hoa Binh. — Distinct, à première vue, des précédents par les élytres bombés antérieurement.

Allecula insignata n. sp. Parum elongatus, paulo nitidus, luteo pubescens, niger, membris elytrisque testaceis, capite aliquot antice pallidiore ; thorace subopaco, dense punctato ; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis convexis. Long. 7-8 mill. Hoa Binh. — Voisin de *obliquefasciata* Pic.

Synallecula gracilicornis n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, antennis nigris, ad basim testaceis, his gracilibus ; capite thoraceque dense punctatis, subnitidis ; elytris elongatis, fortiter striato-punctatis, intervallis distincte punctatis. Long. 5 mill. Rhodesia. — Plus clair et plus brillant que *Caroli* Pic, avec les antennes plus minces.

S. pubescens n. sp. Elongatus, subparallelus, fere opacus, longe pubescens, rufescens, antennis nigris, ad basim rufis; capite fortiter parum dense punctato; thorace dense punctato, fere opaco; elytris fere instriatis, diverse non dense punctatis. Long. 5 mill. Afrique-Or. — Voisin de *obscuripalpis* Pic, prothorax plus transversal, dessus à pubescence plus nette et plus couchée.

S. subparallela n. sp. Elongatus, fere opacus, rufocastaneus, membris pallidioribus; capite thoraceque dense punctatis; elytris elongatis, distincte et regulariter striato-punctatis, intervallis distincte punctatis. Long. 8 mill. Abyssinie. — Diffère de *cherenensis* Pic par les élytres plus fortement striés, moins brillants, la coloration plus foncée.

S. atriceps n. sp. Elongatus, subnitidus, rufus, antennis, articulis primis exceptis, nigris, capite postice et elytris late castaneis; thorace dense punctato, sat lato, antice valde attenuato; elytris fere instriatis, disperse sat regulariter punctatis. Long. 8 mill. Afr. Or. — A placer près de *ruficornis* Pic, en diffère par les antennes bicolores, la forme moins droite, le prothorax plus robuste.

S. convexicollis n. sp. Oblongus, convexus, nitidus, niger, thorace circa diverse, humeros et sutura pro parte rufis; thorace dense punctato; elytris minute striato-punctatis, intervallis distincte punctatis. Long. 7 mill. Abyssinie. — Caractérisé par sa convexité nette, jointe à sa coloration.

S. ocularis n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, pedibus pallidioribus, orulis et capite postice nigris, his junctis et maximis; antennis validis; thorace transverso, dense punctato, postice triimpresso; elytris sat brevibus, striato-punctatis, intervallis non regulariter punctatis. Long.

5 mill. Sénégal. — Espèce très distincte par sa tête noire en arrière, munie d'énormes yeux.

Leptura (Strangalina) rufimembris n. sp. Angustatus, parum nitidus, luteo pubescens, rufo-testaceus, capite, thorace et infra corpore nigris, elytris testaceis, in disco antice ante et post medium piceo notatis, sutura et lateraliter antice nigro-piceo cinctis; capite latissimo; antennis elongatis, thorace elongato; elytris postice attenuatis, apice subtruncatis; abdomine prominulo, pygidio apice rufo; pedibus gracilibus, rufis, femoribus posticis intus piceo lineatis. Long. 10 mill. Tonkin: Chapa. — Voisin de *bilineaticollis* Pic, élytres moins allongés, prothorax tout noir, etc.

Strangalina atrocincta n. sp. Sat angustatus, elytris postice valde strangulatis, griseo pubescens, niger, antennis, femoribus plus minusve et thorace supra rufis, elytris nigris, in disco rufo-testaceo vittatis, plaga infra humeralis rufa; capite latissimo, antennis apice parum validis; thorace elongato; elytris ad basim latis, postice strangulatis, apice subtruncatis et dehiscentibus; abdomine prominulo; pedibus gracilibus. Long. 11 mill. Chapa. — Espèce très distincte par sa particulière coloration élytrale.

Chelidonium binotatum v. nov. **uninotatum**. Elytris ad suturam solum luteo notatis. Laos.

C. luteonotatum n. sp. Elongatus, parum nitidus, viridescens, elytris ad humeros cupreo notatis, antennis nigris, elytris in disco ante et post medium breve luteo notatis; infra corpore dense argenteo pubescente; thorace elongato, lateraliter dentato, in disco pro parte plicatulo; elytris densissime et minutissime punctatis. Long. 10-12 mill. Chapa. — Voisin de *binotatum* Brogn., avec

les macules jaunes des élytres autrement disposées et les antennes inermes.

Demonax rufogriseus n. sp. Angustatus, nitidus, rufescens, supra griseo, infra pro parte albo pubescens, elytris antice nigro notatis (macula prescutellaris, macula discoidalis antemediana) et post medium transverse nigro fasciatis ; articulis 3-4 antennarum breve spinosis ; thorace parum elongato, postice paulo strangulato ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, apice truncatis, externe longe dentatis ; pedibus sat brevibus. Long. 8 mill. Dalat. — Espèce très distincte par sa coloration, jointe à son revêtement ; peut se placer près de *Salvazai* Pic.

Rhaphuma grisescens n. sp. Angustatus, parallelus, niger, griseo pubescens, thorace postice, scutello et infra corpore dense albo pubescentibus ; thorace elongato, antice paulo attenuato ; elytris parallelis, parum dense griseo pubescentibus, post medium et ante apicem vage albo fasciatis ; pedibus longissimis. Long. 10 mill. Dalat. — A placer près de *diversipennis* Pic, très distinct par son revêtement gris et blanc.

Xylotrechus dalatensis n. sp. Elongatus, parallelus, niger, pro parte griseo pubescens ; capite minute tricarinato ; thorace subglobuloso ; lateraliter griseo pubescente, nigro bimaculato ; scutello albo ; elytris ad basim griseo semi-annulatis et post medium arcuate griseo fasciatis, apice griseo notatis. Long. 12 mill. Dalat. — Voisin de *fuliginosus* Frm., en diffère par le prothorax plus globuleux, bimaculé de noir, la première fascie en forme d'anneau ouvert extérieurement.

X. semimarginatus n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, pro parte griseo aut albo pubescens, elytris signa-

turis testaceis et griseo pubescentibus ornatis ; capite bicarinato ; thorace postice paulo dilatato et ad basim strangulato, medio nigro vittato et lateraliter nigro maculato ; scutello grisescente ; elytris apice paulo attenuatis, ad basim et apicem testaceo maculatis, antice et infra signaturis testaceis X formantibus ornatis, post medium transverse testaceo fasciatis et externe pro parte testaceo marginatis. Long. 12 mill. Saïgon. — Voisin de *atronotatus* Pic, bandes un peu différentes, plus nettement tranchées, jointes par une bordure testacée latérale.

X. Salvazai n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, niger, pro parte griseo aut albo pubescentibus, antennis apice testaceis, elytris ad scutellum breve et apice late griseo notatis, post medium late et triangulariter griseo fasciatis et externe testaceo notatis, antice oblique et sinuate testaceo fasciatis et in disco griseo pubescentibus ; capite unicarinato, carina postice furcata ; thorace elongato, postice paulo dilatato, ad basim strangulato, griseo pubescente, postice medio nigro lineato et externe nigro maculato. Long. 15 mill. Dalat. — Très distinct du précédent par les élytres plus atténués postérieurement, le prothorax plus long et les dessins des élytres.

Trachystola dorcadionoides n. sp. Elongatus, opacus, niger, fulvo pubescens ; antennis brevibus, scapo intus apice tuberculato ; thorace sat elongato, supra inæquale, lateraliter tuberculato-dentato ; elytris angustatis, elongatis, humeris nullis, in disco longitudinaliter sinuate et interrupte plicato-carinatis, externe subdenticulatis. Long. 16-22 mill. Dalat. — Espèce très distincte par sa forme et sa sculpture élytrale. A placer près de *asidiformis* Pic.

Anamera obesa n. sp. Robustus, sat brevis, rufes-

cens, capite thoraceque pro parte piceis, pro parte dense griseo aut luteo pubescens ; antennis corpore superantibus, rufis, articulis 3 et sequentibus apice fusco annulatis ; capite thoraceque griseo bivittatis, illo breve et lato ; elytris latis, sat brevibus, apice attenuatis, pro parte et irregulariter luteo pubescentibus, sparse punctatis. Long. 17 mill. Tonkin. — Voisin de *concolor* Lac., moins foncé, tête à bandes grises, etc.

Falsoereis semiscalaris n. sp. Parum elongatus, niger, supra pro parte griseo notatus, infra dense griseo pubescens ; antennis nigris, articulis 2°-3° ad basim et 4° toto albis, 4° infra nigro fasciculato ; thorace subcylindrico, medio late griseo vittato ; elytris postice attenuatis, ad suturam pro parte griseo et irregulariter pubescentibus, antice externe et postice multi griseo maculatis ; pygidio medio griseo maculato ; tibiis medio albo notatis. Long. 15 mill. Indochine. — Les dessins des élytres formant une sorte d'échelle suturale irrégulière, sont très différents de ceux de *cephalotes* Pic.

Enes cristatus n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, articulis 2 et sequentibus antennarum ad basim, scutello et infra corpore albo pubescentibus, elytris ad humeros uni, ad medium et ante apicem multi et minute albo maculatis, maculis posticis pro parte junctis ; antennis gracilibus, corpore sat longioribus, infra sparse ciliatis ; thoracé sat breve et parum lato, lateraliter medio minute tuberculato ; elytris parum elongatis, postice attenuatis, apice subemarginatis, ad basin cristatis. Long. 7 mill. Annam. — Espèce très distincte par la présence d'une crête antérieure discale.

Anaches simplex. Elongatus, nigro-piceus, pro parte griseo aut luteo pubescens ; antennis gracilibus ; thorace breve et lato, supra multi noduloso ; elytris inæquale

punctatis et pro parte plicatis, parallelis, apice subarcuatis, ante medium externe late albo-fulvo maculatis, ad basim et apicem multi luteo maculatis. Long. 12 mill. Dalat. — Espèce distincte, à première vue, par la terminaison simple des élytres.

Salvazaon n. gen. Antennis brevibus, villosis, apice valde acuminatis ; thorace lateraliter post medium tuberculato ; pedibus brevibus, villosis ; prosterno parum lato, postice declive ; mesosterno sat angustato. — Genre voisin de *Pseudanesthetis* Pic et s'en distinguant, à première vue, par ses antennes robustes et très acuminées.

Salvazaon metallicum n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, villosus, nigro-metallicus, elytris olivaceo-æneis, sat fortiter et sparse punctatis ; thorace medio fere læve, postice et lateraliter granuloso. Long. 10 mill. Annam (ex Vitalis).

Serixia inapicalis n. sp. Elongatus, testaceus, griseo pubescens, antennis nigris ; capite cum oculos thorace paulo latiore, sparse punctato ; thorace breve et lato, parum punctato ; elytris thorace paulo latoribus, elongatis, parallelis, mediocre lineato punctatis, postice fere impunctatis. Long. 10 mill. Chapa. — Plus allongé que *sedata* Pasc., avec les élytres concolores.

Le **S. laticeps** mihi, du Tonkin, très voisin du précédent et de coloration analogue, à la tête nettement plus large que le prothorax, ce dernier moins court est nettement rétréci vers la base et les élytres sont distinctement ponctués vers l'extrémité.

Aserixia cincta mihi, du Tonkin, est noir, avec le dessus de la tête et du prothorax d'un jaune orangé, les

élytres orangés bordés de noir, tandis que *Savioi* Pic n'est pas ceint de foncé.

Chreonoma Fortunei v. nov. obscuricollis. Thorace pro parte obscure pubescente, elytris ante apicem et ad basim nigro notatis, macula basalis postice trilobata. Chapa.

Stibaria obsoleta v. nov. grisescens. Rufus, antennis, elytris, his dense griseo pubescentibus, tibiis apice tarsisque nigris. Cochinchine.

Pardaloberea curticollis n. sp. Angustatus, rufus, antennis, elytris apice late, abdomine pedibusque pro parte nigris; antennis corpore non superantibus; capite robusto, parum elongato; thorace parum elongato, ante basim paulo dilatato, pro parte transverse plicato; elytris elongatis, lineato punctatis. Long. 16 mill. Cochinchine. — Diffère nettement de *curvaticeps* Pic par la tête plus grosse et le prothorax bien plus court.

Nupserha lineatipes n. sp. Sat brevis, postice attenuatus, rufus, capite, antennis, pygidio, elytris apice late et lateraliter pro majore parte postice nigris, pedibus testaceis, tibiis anticis et intermediis paulo nigro lineatis, posticis nigris, ad basin testaceis; capite lato, fortiter sat sparse punctato, medio sulcato; thorace breve et lato, fere impunctato; elytris sat brevibus, postice attenuatis, apice bidentatis, fortiter lineato-punctatis. Long. 10 mill. Cochinchine. — A placer près de *testaceipes* Pic, moins allongé, prothorax sans ponctuation nette, élytres plus fortement ponctués, etc.

N. 6-maculata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, luteo pubescens, parum nitidus, rufus, antennis pedibusque posticis nigris, metasterno lateraliter et segmentibus 2,3 abdominis externe nigro maculatis; thorace postice

distincte strangulato et transverse sulcato ; elytris externe bicostatis, postice attenuatis, apice bidentatis. Long. 15 mill. Sumatra. — Espèce caractérisée par ses élytres longs, bicostés et les 6 macules noires du dessous du corps.

Oberea taliana v. nov. brevelineata. Elongatus, niger, supra testaceus, elytris in disco antice reducte nigro lineatis, membris pro parte rufis. Yunnan.

O. bisbinotata n. sp. Elongatus, griseo pubescens, parum nitidus, niger, thorace, scutello, pygidio, abdomine apice membrisque testaceis, articulis primis antennarum nigris, elytris nigris, ad basin in singulo testaceo binotatis, externe longiore, his externe costatis, apice oblique truncatis. Long. 10-11 mill. Tonkin. — Par sa forme, voisin de *taliana* Pic, très distinct par les élytres foncées, marquées chacune vers l'écusson et les épaules de macules claires variant un peu de forme.

O. bicoloritarsis v. nov. subparallela. Elytris in disco late nigris, vage testaceo notatis, his subparallelis. Tonkin. — Diffère, à première vue, de la forme type par les élytres non fortement rétrécis en arrière.

O. chapaensis n. sp. Angustissimus, postice attenuatus, griseo pubescens, parum nitidus, testaceus, antennis, tibiis et tarsis posticis nigris, pygidio supra paulo brunnescente, elytris lateraliter pro parte brunneo cinctis, his longissimis, postice attenuatis, in disco reducte costatis, apice bidentatis. Long. 15 mill. Chapa. — Voisin de *formosana* Pic, s'en distingue, à première vue, par les élytres non bordés de foncé à l'apex.

Leptispa atricolor n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger ; thorace brevis et lato, fortiter diverse et sparse punctato, antice lateraliter subrotundato ; elytris thorace

paulo latioribus, lateraliter subsinuatis, postice valde explanatis, apice subrotundatis, in disco minute lineato-punctatis, ad suturam postice et externe striatis, lateraliter fortiore punctatis. Long. 5 mill. Chapa. — Diffère de *nigra* W. par la forme moins allongée et la ponctuation différente des élytres.

Ceratobasis Vitalisi n. sp. Oblongus, nitidus, infra argenteo pubescens, nigro-viridescens, antennis ad basin rufis, thorace antice externe late luteo fasciato ; elytris luteis, transverse nigro-viridescente bifasciatis, ad apicem breve viridi notatis aut piceo marginatis ♀. Long. 10-11 mill. Cochinchine (ex Vitalis). — Diffère de *ceylonensis* Jac. par les dessins foncés différents et les pattes métalliques.

La var. nov. **postbinotatus** offre les élytres largement foncés avec 2 étroites bandes ondulées claires, une basale, une médiane jointes sur les côtés et deux macules antéapicales jaunes disposées transversalement.

Clytrasoma laosensis n. sp. Elongatus, infra argenteo pubescens, niger, thorace antice externe et lateraliter luteo, elytris luteis, ad medium nigro fasciatis, antice et postice nigro maculatis ; antennis longe pectinatis. Long. 10 mill. Laos. — Voisin de *conformis* Lac. par sa forme, prothorax autrement coloré, élytres avec une fascie médiane noire jointe par la suture.

Aspidolopha trinotata n. sp. Sat brevis, nitidus, infra argenteo pubescens, viridescens, antennis ad basim, tibiis tarsisque rufis ; thorace rufo, postice transverse cyaneo fasciato ; scutello rufo, apice cyaneo et carinato ; elytris rufis, ad humeros cyaneo maculatis, ad medium et ante apicem reducte cyaneo fasciatis, his latis et brevibus, fortiter et irregulariter punctatis. Long. 5 mill. Co-

chinchine. — A placer près de *melanophthalma* Lac. ; très distinct par ses élytres à dessins bleus.

A. trinotata v. nov. humeralis. Elytris rufis, ad humeros cyaneo maculatis. Cochinchine.

Ætheomorpha cyanea n. sp. Oblongus, fere opacus, infra argenteo pubescens, cyaneus, antennis ad basim rufo tinctis ; capite inter oculos impresso ; thorace diverse et fortiter punctato ; elytris thorace paulo latioribus, lateraliter subsinuatis, costulatis, intervallis multi et dense punctatis. Long. 8 mill. Laos. — Espèce des plus distinctes par sa coloration bleue et sa sculpture élytrale.

Cryptocephalus pygidiomaculatus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, testaceus, multi nigro maculatus, pectore et abdomine nigro notatis ; thorace testaceo, in disco late nigro-bimaculato, indistincte punctato ; scutello nigro ; elytris in singula quinque (2, 2, 1) nigro maculatis, minute lineato punctatis ; pygidio-testaceo, medio postice nigro maculato. Long. 5 mill. Laos. — A placer près de *sannio* Redt.

C. Salvazai n. sp. Robustus, nitidus, niger, labro rufo, capite infra oculos et thorace lateraliter antice luteo notatis, elytris nigris, ad scutellum lateraliter medio et apice late luteo notatis, his minute lineato-punctatis. Long. 8 mill. Laos (ex Vitalis). — Voisin de *Lajoyei* Pic, plus robuste et dessins différents.

C. laosensis n. sp. Oblongus, nitidus, rufus, antennis apice nigris, capite elytrisque testaceis, his nigro cinctis, minute lineato-punctatis ; thorace indistincte punctato ; scutello foveolato. Long. 4,5 mill. Laos. — Voisin de *lineatotibialis* Pic, plus roux, élytres sans bande basale noire, etc.

Goniopleura tonkinea n. sp. Testaceus, pro parte rufus, antennis, articulo 1° excepto, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris, elytris ad scutellum et ad humeros nigro-piceo notatis. Long. 15 mill. Chapa. — Voisin de *Moseri* W., en diffère, à première vue, par les élytres marqués de foncé.

G. suturalis n. sp. Rufus, antennis apice thoraceque in disco nigris, elytris pallidioribus, antice ad suturam et externe nigro vittatis, vittis post medium prolongatis. Long. 13 mill. Tonkin. — En plus de la coloration, diffère du précédent par les antennes moins épaisses à la base, sans articles impressionnés.

Leprotus testaceipes n. sp. Oblongus, opacus, griseo pubescens, pro parte squamosus, dense punctatus, niger, antennis ad basim pedibusque testaceis. Long. 7 mill. Japon : Kioto. — Très distinct de *gracilicornis* Pic, par le corps pileux en dessus, peu squamuleux sur les élytres et les pattes claires.

L. impressa n. sp. Oblongus, sparse griseo pubescens, parum nitidus, niger, labro antennisque ad basim rufis ; capite thoraceque dense ruguloso-punctatis, illo parum elongato ; elytris latis et brevibus diverse pro parte dense punctatis, post scutellum impressis, humeris prominulis ; femoribus parum gracilibus, dentatis. Long. 8 mill. Chapa. — Voisin de *kanarensis* Jac., en diffère nettement par le prothorax moins large et les élytres fortement impressionnés derrière l'écusson.

Pseudometaxis hirsutus n. sp. Oblongus, opacus, niger, labro, antennis femoribusque pro parte rufis, infra griseo pubescens, supra dense luteo squamosus, elytris distincte punctatis et longe hirsutis ; thorace sat breve, antice attenuato, lateraliter minute et multi denticulato ;

femoribus posticis robustissimis et fortiter dentatis. Long. 4,5 mill. Chapa. — Espèce très distincte par son revêtement et les longs poils sombres des élytres. A placer près de *tonkineus* Pic.

Trichochrysea birmanica n. sp. Latus et parum brevis, supra paulo nitidus, sat dense et parum longe albo pubescens, viridis, supra obscurior, capite thoraceque dense punctatis ; elytris pro parte minute, pro parte fortiore punctatis ; antennis ad basim rufo tinctis. Long. 10 mill. Birmanie. — Voisin de *viridis* Jac. et s'en distinguant, à première vue, par le dessus du corps d'un vert teinté d'obscur.

T. laosensis n. sp. Sat latus et parum brevis, vage nitidus et breve hirsutus, niger, elytris cyaneis, ad basim transverse purpureo-cupreo fasciatis et postice in disco purpureo-cupreo arcuate fasciatis, fascia antice prolongata, intus longiore ; capite dense ruguloso-punctato ; thorace fortiter et dense punctato ; elytris pro parte minute, pro parte fortiore, punctatis. Long. 8 mill. Laos (ex Vitalis). — A placer près de *splendida* Achard, mais coloration générale noire et dessins pourpré-cuivreux des élytres différents.

Chrysochus adonis n. sp. Oblongus, nitidus, infra parum pubescens, antennis ad basim rufis, viridis, pro parte aurato tinctus, capite viridi-cyaneo, antice cupreo tincto ; thorace cupreo-purpureo, postice medio viridi maculato, minute et sparse punctato ; elytris violaceo-viridibus, ad scutellum et ad humeros cupreo-purpureo maculatis, in disco longe triangulariter cupreo-purpureo notatis, sutura antice purpurea, his irregulariter diverseque punctatis. Long. 10 mill. Laos. — Jolie espèce pouvant prendre place près de *siamensis* Jac.

Tillopsis lemaoides n. sp. Angustatus, nitidus, infra sparse pubescens, viridis, supra cyaneo-violaceus ; antennis nigris, ad basim rufo-tinctis, gracilibus, apice paulo crassiusculis ; capite parum breve, fortiter et sparse punctato ; thorace subcylindrico, fortiter et sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, lateraliter subsinuatis, postice attenuatis, dense sat dense punctatis, externe pro parte plicatis. Long. 7 mill. Chapa. — Espèce très particulière par sa forme, à faciès de *Lema* Lac., et que je place dubitativement dans le genre *Tillopsis* Berl.

Lopheia Salvazai n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, breve et sparse griseo pubescens, nigro-violaceus ; thorace breve, sat lato, dense, medio minute, et sparse punctato ; elytris sat fortiter et sparse punctato. Long. 11 mill. Laos (ex Vitalis). — Très distinct de *tonkinea* Pic par la coloration violacée et la ponctuation écartée du dessus du corps.

Callisina rufipes n. sp. Rufus, antennis apice, infra corpore elytrisque nigris, his ad basim et ante apicem luteo fasciatis, fascia prima intus postice prolongata ; capite dense et thorace sparse punctatis, elytris minute lineato-punctatis, post humeros paulo impressis. Long. 5 mill. Yunnan. — A placer près de *Balyi* Jac.

C. trigibbosa n. sp. Rufus, antennis, his ad basim rufis, infra corpore pro parte, elytris ad suturam et externe ad medium nigro-metallicis ; capite parum dense punctato ; thorace minute et sparse punctato, rufo, postice late viridi tincto ; elytris minute lineato-punctatis, ad basim et externe trigibbosis. Long. 5 mill. Chapa. — Espèce très distincte par ses élytres ayant chacune 3 gibbosités inégales, dont une humérale.

C. laosensis n. sp. Nigro-piceus, pro parte brunnes-

cens, antennis ad basim femoribusque pro parte rufis, elytris ad basim bi et postice uni luteo-fulvo gibbosis ; capite thoraceque sat dense punctatis, elytris dense lineato-punctatis. Long. 5 mill. Laos. — Diffère de *birmanica* Jac. par la ponctuation plus rapprochée du prothorax, les élytres substriés vers la suture, etc.

Corynodes purpureipennis n. sp. Oblongus, nitidus, infra pubescens, cyaneus, pro parte violaceus, elytris purpureis, viridi aut cyaneo marginatis, his minute et sparse punctatis ; thorace diverse et sparse punctato. Long. 10-11 mill. Yunnan. — Voisin de *Davidi* Lef., mais coloration un peu différente et prothorax à ponctuation écartée. — Diffère, d'autre part, et à première vue, de *ignescens* Berl., par la ponctuation écartée des élytres et ces organes plus larges.

Acrothinium cyaneipes n. sp. Oblongus, nitidus, pro parte griseo pubescens, cyaneus, pro parte viridi tinctus, aliquot capite medio thoraceque cupreo-purpureis, antennis nigris, ad basim rufis ; thorace minute et sparse punctato ; elytris diverse non fortiter sat sparse punctatis, humeris prominulis. Long. 8 mill. Chine (ex R. P. Savio). — Voisin de *cupricolle* Jac., en diffère par les pattes à reflets bleus, la suture des élytres de la coloration générale de ces organes qui sont d'un bleu violacé obscur.

Oides leucomelaena W. Varie par le prothorax 4 maculé de foncé et les élytres ornés postérieurement d'une fascie sinuée foncée (v. nov. **subsiniuata**) ou prothorax bimaculé et fascie postérieure décomposée en taches (v. nov. **disjuncta**). Tonkin.

O. multimaculata n. sp. Subovatus, testaceus, antennis apice nigris, thorace nigro bimaculato, elytris testa-

ceis, septem nigro maculatis (2, 1 externa, 2, 2) ; capite inter oculos foveolato ; thorace breve et lato, lateraliter arcuato, minutissime et sparse punctato, in disco late nigro bimaculato ; elytris late marginatis, ad medium paulo ampliatis, postice paulo attenuatis, minute et sparse punctatis. Long. 8 mill. Chapa. — Voisin de *maculosa* Gahan, en diffère, à première vue, par l'écusson testacé, le dessous immaculé et les 7 macules des élytres autrement disposées.

Galerucella angulosa n. sp. Parum nitidus, griseo pubescens, niger, supra fulvo-testaceus, scutello nigro ; thorace particulare, antice et postice medio paulo inciso, lateraliter sinuato, angulis prominulis, supra late biimpresso et pro majore parte dense ruguloso-punctato ; elytris thorace valde latioribus, subparallelis, apice paulo attenuatis, depressis, irregulariter minute et dense punctatis, humeris rotundatis. Long. 5 mill. Dalat. — Espèce caractérisée par la structure particulière du prothorax.

Falsoplatyxntha lineata n. sp. Elongatus, opacus, griseo aut luteo pubescens, niger, thorace, illo medio nigro lineato et sulcato, elytris que aurantiacis, his elongatis, costulatis. Long. 8 mill. Indes. — Diffère, à première vue, de *aurantiaca* Pic par les costules élytrales moins saillantes et plus droites, le prothorax moins robuste et linéolé de noir, la tête foncée, etc.

Bruchus multinotatus n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, subopacus, luteo pubescens, rufescens, elytris multi et reducte griseo lineatis ; capite elongato ; antennis brevibus, apice paulo dilatatis, nigris, ad basim rufis ; thorace obconico, breve, parum fortiter et dense punctato ; elytris lateraliter subarcuatis, ad basin tuberculatis et ad suturam antice excavatis, striatis, humeris nullis ; pygidio elongato, prominulo,

rufo, irregulariter pubescente ; pedibus posticis validis, femoribus inspinosis, tibiis carinatis. Long. 5 mill. Natal. — Voisin de *natalensis* Pic.

Le *subuniformis* mihi, de la même origine, de forme et coloration analogues au précédent, s'en distingue par les antennes moins élargies à l'extrémité, la ponctuation plus forte et moins rapprochée du prothorax, la pubescence presque uniforme des élytres.

B. brevelineatus n. sp. Oblongo-elongatus, antice et postice attenuatus, opacus, paulo griseo pubescens, niger, capite elongato ; antennis sat brevibus, nigris, ad basim rufis ; thorace obconico, dense ruguloso-punctato, ante scutellum breve albo lineato ; scutello albo ; elytris lateraliter subarcuatis, ad basim tuberculatis, striatis, parum distincte, pro parte minute, albo maculatis ; pygidio elongato, dense punctato, infra corpore lateraliter pro parte luteo notato. Long. 6 mill. Congo. — A placer près de *longipennis* Pic.

Calochromus ramicornis n. sp. Angustatus, nitidus, niger, infra pro parte cyanescens, thorace elytrisque rubro pubescentibus ; antennis sat longe flabellatis. Long. 8 mill. Indochine. — Par la structure des antennes, se rapproche de *subflabellatus* Pic et en diffère, à première vue, par les élytres concolores.

C. dalatensis n. sp. Angustatus, nitidus, nigro-cyanescens, supra parum dense purpureo pubescens ; antennis elongatis, parum crassis, apice angustatis ; thorace breve et lato, medio sulcato, lateraliter fortiter 4 impresso, antice medio inciso ; elytris fortiter et multi costatis. Long. 15 mill. Dalat (ex Vitalis). — Voisin de *impressipes* Pic, très distinct par la structure du prothorax et le revêtement pubescent peu fourni, surtout sur les élytres, qui ont une transparence bleutée.

Cautires apicalis n. sp. Elongatus, pro parte opacus, niger, elytris apice aurantiaco notatis, antennis sat robustis, flabellatis ; thorace parum transverso, antice attenuate sinuato, 7 areolato, postice nitido ; elytris thorace non latioribus, parallelis, fortiter costatis. Long. 11 mill. Annam. — Espèce très distincte par sa particulière coloration élytrale.

Leptotrichalus atrimembris n. sp. Angustatus, subopacus, niger, pectore abdomineque cyaneis, thorace, scutello elytris que testaceis ; thorace elongato et angustato, antice attenuato, longe areolato, angulis posticis paulo prominulis. Long. 6-8 mill. Indochine. — Voisin de *pubithorax* Pic, dont il diffère, à première vue, par le prothorax non foncé.

Dilophotes particularis n. sp. Elongatus, opacus, niger, pro parte fuliginosus, thorace testaceo, postice medio brunnescente, illo in disco carinato, postice impresso, pro parte ruguloso, angulis posticis prominulis ; elytris rubris, lateraliter subsinuatis, fortiter tricostatis ; antennis depressis. Long. 6 mill. Indochine. — Distinct de *dilaticornis* Pic par la structure du prothorax, les antennes plus courtes à articles plus épais, les élytres à 3 côtes, etc.

Drilosilis atricolor n. sp. Parum elongatus, nitidus, griseo pubescens, niger, antennis elongatis, pectinatis ; thorace breve et lato, supra inæquale, angulis posticis minutis ; elytris parum elongatis, dense ruguloso-punctatis. Long. 8 mill. Chapa. — Voisin de *mentaweinsis* Pic, antennes différentes, plus longues, prothorax moins incisé, élytres plus nettement ponctués.

TABLE
POUR LE CINQUANTE-DEUXIÈME FASCICULE

	Page
Nouveautés diverses.	1

This book is a preservation facsimile produced for
the University of Illinois, Urbana-Champaign.
It is made in compliance with copyright law
and produced on acid-free archival
60# book weight paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper).

Preservation facsimile printing and binding
by
Northern Micrographics
Brookhaven Bindery
La Crosse, Wisconsin
2011

