



I L L I N O I S

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN

PRODUCTION NOTE

University of Illinois at
Urbana-Champaign Library
Brittle Books Project, 2011.

COPYRIGHT NOTIFICATION

In Copyright.

Reproduced according to U.S. copyright law USC 17 section 107.

Contact dcc@library.uiuc.edu for more information.


This digital copy was made from the printed version held
by the University of Illinois at Urbana-Champaign.
It was made in compliance with copyright law.

Prepared for the Brittle Books Project,
Preservation Department, Main Library,
University of Illinois at Urbana-Champaign

by

Northern Micrographics
Brookhaven Bindery
La Crosse, Wisconsin

2011



EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

CINQUANTE-SIXIÈME FASCICULE

(20 juin 1930)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHIEN, 15

—
1930

Tous droits réservés

Naturel History Library

595.76

P58m

pt. 56

Nouveautés diverses ⁽¹⁾

Kuilua apicicornis n. sp. Elongatus, supra fere opacus, antennis apice testaceis, supra aurantiacus, capite medio nigro notato et elytris apice sat late nigris, his lateraliter subcarinatis. Long. 10 mill. Gabon. — Caractérisé à première vue, par les antennes non entièrement noires.

Antonafia testaceipes n. sp. Elongatus, postice attenuatus, opacus, rufescens, antennis, capite postice, thorace in disco rufo aut aurato vittatis; capite lato, in vertice aurato vittato; thorace elongato, antice attenuato, medio aurato vittato; scutello aurato pubescente; elytris thorace valde latioribus, postice attenuatis; pedibus testaceis, tibiis apice pro parte piceis. Long. 10 mill. Congo. — Voisin de *modesta* Jac., en diffère, à première vue, par la bande discale rousse des élytres et la coloration claire des pattes.

Sphondylia atricollis n. sp. Oblongo-elongatus, griseo pubescens, subnitidus, niger, femoribus posticis et abdomine pro parte rubris, elytris in disco antice vage luteo-notatis, ad suturam medio griseo vittatis et post medium griseo fasciatis; capite sat robusto; thorace brevis et lato, lateraliter subarcuato, postice minute transverse sulcato; elytris thorace paulo latioribus, sat brevibus; post humeros paulo strangulatis, postice subparallelis; parum fortiter, pro parte dense, punctatis; abdo-

(1) Les nouveautés sans désignation particulière font partie de la collection Pic. Les insectes de Hoa-Binh proviennent du R. P. de Cooman, ceux de Chapa, de feu Jeanvoine.

mine rubro, apice nigro. Long. 8 mill. Congo. — Voisin de *mutillaria* Clark., en diffère, à première vue, par le prothorax foncé.

Lema maracoensis n. sp. Oblongus, nitidus, infra breve et sparse pubescens, testaceus ; capite inter oculos bigibbuloso et sulcato, postice impunctato ; antennis elongatis et gracilibus ; thorace breve et lato, antice dilatato et anguloso, postice depresso et transverse unistriato, parum et minute punctato ; elytris latis, parum elongatis, subparallelis, postice attenuatis, parum fortiter lineato-punctatis, postice substriatis. Long. 5 mill. Abyssinie. — Un peu moins robuste que *notatithorax* Pic, avec le prothorax différent et la coloration générale claire.

L. Crampeli n. sp. Oblongus, nitidus, infra sat sparse pubescens, niger, elytris cupreo-purpureis ; capite inter oculos sulcato, postice fere impunctato, antennis parum crassis ; thorace sat breve et lato, antice rotundato-dilatato, externe minute tuberculato, postice depresso et transverse bisulcato, in disco fere impunctato et bigibboso ; elytris latis, parum elongatis, sat fortiter foveolato-punctatis et transverse plicatis, apice costulatis. Long. 8 mill. Congo : Fort Crampel. — A placer près de *foraminosa* Lac., en diffère au moins par la sculpture différente du prothorax.

Crioceris Vitalisi n. sp. Oblongus, cyaneo-metallicus, elytris antice testaceis, ad scutellum cyaneo-maculatis, postice late cyaneis, abdomine rufo. Long. 12 mill. Tonkin (ex Vitalis). — Très voisin de *adonis* Baly, en diffère, à première vue, par la macule antérieure métallique des élytres subarrondie et l'abdomen roux ; diffère, d'autre part, de *adonis* Pic par la partie métallique postérieure des élytres plus droite en avant et l'abdomen roux.

Cryptocephalus pallidilabris n. sp. Robustus, nitidus,

niger, labro luteo, capite ad oculos et infra corpore luteo notatis, thorace postice nigro, antice luteo, élytris nigris, antice luteo sinuato-fasciatis et apice late luteo maculatis, his lineato-punctatis ; antennis gracilibus, nigris, ad basim pro parte rufis. Long. 8 mill. Laos. — Voisin de *Salvazai* Pic, en diffère par le prothorax jaune sur toute sa partie antérieure, les élytres antérieurement fasciés, et non maculés, de jaune.

Pseudaoriana s. genre nov. (de *Pseudaoria* Jac.). Elytris non rugosis, ad basim impressis, sparse pilosis ; thorace postice distincte marginato. Sous-genre établi pour la nouveauté suivante :

Pseudaoriana Le Moulti n. sp. Oblongus, nitidus, sparse luteo pilosus, rufo-testaceus, thorace pro majore parte brunneo-piceo, capite piceo, medio testaceo, antennis apice, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris ; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis ; élytris minute, pro parte lineato-punctatis, humeris paulo prominulis. Long. 6 mill. Chine. Acquis chez Le Moul. — Très distinct de *P. burmanica* Jac., en outre de la coloration claire, par la sculpture élytrale.

Cephalolia nigrithorax n. sp. Elongatus, nitidus, niger, supra vage subæneus, élytris minute rufo-marginatis, femoribus anticis rufonotatis ; capite medio concavo, parum fortiter, diverse, sparse punctato ; antennis parum gracilibus ; thorace fere subquadrato, fortiter et sparse punctato, medio et antice pro parte impunctato ; scutello grande, impunctato ; élytris thorace sat latioribus, subparallelis, apice subrotundatis, mediocre lineato-punctatis, ad suturam subsulcatis ; pedibus brevibus et crassis ; pygidio non prominulo. Long. 3 mill. environ. Vénézuéla. — Voisin de *Chevolati* Baly, en diffère, à première vue, par le prothorax foncé et moins large.

Gonophora pulchella Gestro v. nov. Vitalisi. Flavotestaceus, elytris nigro-metallico maculatis. Cochinchine (ex Vitalis). — Variété caractérisée par la coloration générale claire, avec l'avant-corps immaculé.

G. annamita n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, nigro metallicus, elytris in singulo diverse quinque rufo-signatis, capite antice, antennis, articulis basalibus exceptis, pedibus abdomineque testaceis; thorace parum lato, inæquale impresso et punctato; elytris sat latis, subparallelis, inæquale costatis, intervallis fortiter et inæquale impressis. Long. 6 mill. Annam. — A placer près de *xanthomelæna* Wied., en diffère par le prothorax moins large, les antennes nettement bicolores, la coloration.

G. Donckieri n. sp. Oblongo-elongatus, opacus, elytris nitido punctatis, testaceus, scutello nigro, elytris in singulo minute sex (2,2 valde obliquatis, 2 anteaapicalis approximatis) nigro-metallico maculatis; thorace sat transverso, in disco biimpresso; elytris parum latis, subparallelis, humeris paulo prominulis, inæquale costatis, intervallis foveolato-punctatis. Long. 5 mill. Indes Méridionales. — A placer près de *Masoni* Baly.

G. unimaculata n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufo-testaceus, elytris rufo-purpureis, post medium nigro maculatis, antennis nigris, apice rufo-brunneis, articulo primo et secundo pro parte rufis; thorace transverso, postice valde et transverse impresso, antice medio subsulcato et parum punctato; elytris sat latis, apice paulum dilatatis, regulariter costatis, intervallis fortiter impressis. Long. 7 mill. Basilan. — Voisin de *apicalis* Baly, mais plus large, prothorax plus fortement impressionné avec la macule des élytres non-apicale.

La *var. nov. sapitana* est plus étroite, plus petite et a les antennes noires à l'extrémité.

G. Coomani n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, femoribus, capite thoraceque rufis, illo lateraliter piceo-notato et medio piceo-lineato (aliquot thorace rufo, innotato: v. nov. **innotata**), elytris rufo-purpureis, lateraliter subsinuatis et pro parte flavo marginatis, regulariter bicostatis, costa tertia reducta, intervallis pro parte foveolato-punctatis; thorace parum transverso, postice impresso, fortiter et dense punctato, medio sulcatulo. Long. 5-6 mill. Tonkin: Hoa-Binh. — Voisin du précédent.

G. Uhmanni n. sp. Oblongo-elongatus, sat robustus, subnitidus, rufus, elytris ante apicem late nigris (aliquot signaturis nigris reductis et sutura late rufa: v. nov. **reducta**); antennis nigris, apice dilutionibus; thorace robusto, inæquale, fortiter punctato, medio sulcato; elytris latis, subparallelis, regulariter costatis, intervallis profunde impressis aut foveolato-punctatis. Long. 6,5-7 mill. Mentawai. — Plus robuste que le précédent, avec les élytres moins allongés et marqués de noir. Dédié au collègue qui, comme moi, étudie les *Hispides* depuis peu d'années.

Nodostoma laosense n. sp. Subovatus, nitidus, pro majore parte viridi-metallicus, abdomine, tibiis, tarsis antennisque apice nigris, illis ad basim rufis; thorace dense ruguloso-punctato, antice attenuato; elytris latis et brevibus, diverse, pro parte, regulariter punctatis, ad basim minute gibbosis, viridi-cyaneis, callo humerale aurato. Long. 5 mill. Laos. — Sans doute voisin de *nigri-ventre* Lef., en diffère, au moins, par les pattes foncées et la coloration.

N. atrithorax n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, elytris cyaneo violaceis, capite pro parte antennisque ad basim rufis; capite thoraceque minute et sparse

punctatis, illo postice paulo dilatato-angulato ; elytris sat latis et brevibus, sparse, minute, pro parte regulariter, punctatis, ad basim minute gibbosis. Long. 4 mill. Chine: Yunnan.— Peut se placer près de *Oberthüri* Lef., coloration et ponctuation différentes.

N. atrithorax v. nov. notaticeps. Capite rufo, inter oculos æneo notato, thorace paulo olivaceo, elytris viridibus. Chine.

N. semirufum n. sp. Oblongus, nitidus, niger, antennis ad basim, capite, thorace, scutello femoribusque ad basim rufis ; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis, illo parum lato, lateraliter subarcuato et ad medium minute spinoso ; elytris thorace valde latioribus, brevibus, diverse, pro parte sat fortiter, lineato-punctatis, ad suturam substriatis et ad basim paulo gibbosis. Long. 5 mill. Tonkin : Chapa. — A placer près de *Leechi* Jac.

N. chapaense n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-æneus, supra pro parte purpureus et viride cinctus, antennis ad basim tibiisque pro parte rufis. Long. 4 mill. Chapa. — En outre de la coloration, diffère du précédent par le prothorax plus large, à ponctuation moins forte et plus rapprochée, les élytres moins larges par rapport au prothorax.

N. particulare n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-cyanescens, supra cyaneo-violaceus, antennis nigris, ad basim rufis ; thorace parum lato, lateraliter medio minute dentato, fortiter et dense punctato ; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, interne lineato punctatis, externe irregulariter fortiterque punctatis, pro parte tuberculatis et reducte costatis, ad basim sat fortiter gibbosis. Long. 6 mill. Chapa. — A placer près de *Lameyi* Lef., en diffère au moins par la sculpture élytrale particulière.

N. bicoloripenne n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-cyanescens, supra viridi-metallicus, elytris violaceis, lateraliter viride marginatis, antennis nigris, ad basim rufis; thorace parum lato, lateraliter medio minute dentato, fortiter et dense punctato; elytris thorace valde latioribus, sat elongatis, interne striato-punctatis, externe fortiter et regulariter denseque punctatis, ad basim mediocre gibbosis, calo humerale viride. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, coloration et sculpture élytrale différentes.

N. bicoloripes n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, niger, supra viridi-metallicus, antennis ad basim, femoribus apice, tibiis tarsisque pro parte testaceis; thorace mediocre et dense punctato, postice lateraliter paulo angulato; elytris sat latis et brevibus, sparse, minute, pro parte regulariter, punctatis, ad basim minute gibbosis. Long. 4 mill. Yunnan. — Voisin de *Oberthuri* Lef., en diffère, à première vue, par les pattes bicolores et le dessus vert.

La var. nov. **Guerryi**, du Yunnan, est un peu plus trapue et a les élytres bleus.

N. bicolor v. nov. **submarginatum**. Elytris cyaneis, postice et apice rufo marginatis. Tonkin.

N. atritarse n. sp. Suboblongus, latus, nitidus, rufus, elytris viridibus, antennis apice tarsisque nigris; capite thoraceque minute sparseque punctatis, illo lateraliter postice dilatato-subrotundato; elytris latis, sat brevibus, diverse, pro parte minute et regulariter, punctatis, ad basim parum fortiter gibbosis. Long. 5 mill. Chine. — Voisin de *bicolor* Lef., en diffère nettement par la ponctuation plus fine et plus écartée du prothorax, la coloration différente des pattes. Sans doute voisin, d'autre part, de

robustum W., avec au moins une ponctuation prothoracique différente.

N. binhanum n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, rufus, antennis apice pedibusque nigris ; thorace parum transverso, medio lateraliter aliquot paulo angulato, fortiter et sparse punctato ; elytris minute lineato-punctatis, ad basim parum gibbosis, thorace sat latioribus. Long. 4 mill. Hoa-Binh. — Moins robuste que *Martini* Lef. et autrement ponctué.

Engonius undulatus n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, glaber, niger, elytris luteo undulato-bifasciatis et in disco (inter fascias) luteo lineatis ; antennis apice mediocre dilatatis ; thorace nitido, parum transverso, in disco minute punctato, angulis anticis valde prominulis ; elytris thorace paulo latioribus, non elongatis, lateraliter subarcuatis, parum fortiter, sat dense et irregulariter punctatis ; tibiis anticis intus spinosis, intermediis paulo curvatis. Long. 7 mill. Java. — Par son dessin élytral, se rapproche de *perspicillaris* Gert., mais la fascie antérieure a une autre forme, étant ondulée avec prolongement d'un long rameau postérieur externe.

E. Grandjeani n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, glaber, niger, elytris in singulo ad basin majore et post medium transverse aurantiaco-notatis ; antennis apice paulo latioribus ; thorace nitido, parum breve, sat lato, in disco, diverse punctato, lateraliter subsinuato, angulis anticis paulo prominulis, lateraliter postice longe sulcato ; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, lateraliter subarcuatis, diverse pro parte minute, sat sparse et irregulariter punctatis ; tibiis anticis validis, inermibus. Long. 4 mill. Sumbawa (ex coll. Grandjean). — Par la massue des antennes peu large, la place générique de cette espèce peut se discuter ; à la rigueur, on pourrait la placer

dans le genre *Indalmus* Gerst. La très grande macule antérieure des élytres englobant le calus huméral fera reconnaître cette espèce.

Trycherus rufo-cinctus v. nov. reductus. Elytris rufis, in disco antice luteis, antice reducte, medio lato et bilobato, nigro notatis. Gabon. — Variété très distincte par sa particulière coloration élytrale, à dessins noirs réduits.

T. angolensis v. nov. apicalis. Oblongo-elongatus, parum nitidus, niger, elytris ad medium rufo-lineatis et ante apicem rufo-notatis. — La coloration générale est noire comme chez la nuance typique avec les élytres ornés de deux bandes longitudinales roussâtres jointes en avant par une autre transversale, mais la variété se distingue par la présence d'une macule rousse placée tout près de l'apex. Benito dans le Congo Français.

T. fenestratus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, elytris antice diverse luteo lineatis et postice reducte luteo fasciatis, abdomine pro parte rufo ; antennis gracilibus, articulis tribus ultimis dilatatis ; thorace sat lato, postice marginato ; elytris parum elongatis, lateraliter subarcuatis, postice attenuatis. Long. 12 mill. Boroma. — Voisin du précédent, mais dessins des élytres différents, faits de deux bandes longitudinales, partant de la base et jointes postérieurement par une bande transversale, également étroite, et une fascie postérieure bilobée raccourcie placée loin de l'extrémité.

T. appendiculatus v. nov. inapicalis. Niger, infra corpore thoraceque rufis, illo parum transverso, elytris antice et postice reducte luteo undulato fasciatis. Guinée. — Diffère de *appendiculatus* Gerst. par l'apex des élytres foncé.

La var. nov. **nigrithorax**, du Congo, offre une forme moins allongée, avec un prothorax plus large et noir.

Mycetina grandis n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, glaber, niger, thorace lateraliter rufo, elytris in disco longe et late rufo plagiatis, plaga interne et postice reducta ; membris robustis ; thorace breve et lato, medio sat fortiter et sparse punctato, lateraliter parum punctato et late deplanato, ad basin medio minute transverse sulcato et externe longitudinaliter sulcato ; elytris latis, subarcuatis, postice paulo attenuatis, instriatis, diverse pro majore parte, irregulariter punctatis. Long. 5,5 mill. Java. — Voisin de *erubescens* Gorh., mais élytres à ponctuation irrégulière avec leur macule à contours irréguliers, dessous du corps noir, etc.

Milichius callosus n. sp. Oblongo-subovatus, nitidus, rufescens, thorace medio et infra corpore pro parte brunneis, elytris purpureis, ad humeros arcuate nigro-violaceo fasciatis, callis humeralibus luteis, valde prominentibus ; antennis nigris, ad basin rufis ; thorace breve et lato, angulis anticis valde prominulis, sat minute et sparse punctato ; elytris medio valde convexis, apice deflexis et subacuminatis, marginatis, sat fortiter, dense et irregulariter punctatis. Long. 6 mill. Bornéo. — Voisin de *biplagiatus* Arrow., s'en distingue, à première vue, par les antennes en partie foncées.

Ancylopus plicatus n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, nigro-piceus, thorace rufo, medio brunnescente, infra corpore pro parte rufo, elytris ad basin et post medium externe et subtransverse luteo maculatis ; antennis gracilibus, articulis ultimis paulo latioribus ; thorace supra multi et diverse sulcato ; elytris thorace valde latioribus, elongatis, lateraliter subsinuatis, in disco longe et fortiter impressis, intus longitudinaliter plicatis, minute non

dense punctatis ; pedibus elongatis, tibiis gracilibus. Var. Prothorax tout noir et plus large. Long. 6 mill. Sumatra. — Espèce caractérisée, à première vue, par la particulière structure élytrale, ces organes ayant une impression discale munie d'un pli interne.

Lepturoides multiimpressus n. sp. Angustatus, parum nitidus, ruber, antennis, infra corpore pro majore parte nigris, pedibus bicoloratis ; capite multi et diverse impresso, antice carinato et medio paulo inciso ; antennis latis et deplanatis, articulis 3° et sequentibus apice angulatis ; thorace sat elongato, apice paulo attenuato, lateraliter sinuato, angulis posticis prominulis, medio late et inæquale sulcate-impresso, antice externe late foveolato, foveolis pro parte piceis, postice inæquale et antice transverse sulcato ; elytris subparallelis, apice paulo attenuatis, costulatis, intervallis foveolato-punctatis ; pedibus nigris, pro parte brunnescentibus, femoribus ad basin et coxis flavis. Long. 10 mill. Tonkin. — Plus étroit que *rubens* Pill., avec la tête rouge et d'ailleurs bien distinct par la structure de la tête, les fortes et larges impressions du prothorax.

Hybosorus sparsepunctatus n. sp. Oblongus, postice dilatatus, infra corpore, scutello membrisque rufis, capite, thorace elytrisque, his pro parte rufo marginatis, nigris, supra fere opacus ; capite diverse et parum punctato ; thorace minutissime alutaceo, minute et sparse punctato, parum breve, antice attenuato, angulis anticis paulo prominulis, posticis latis, postice paulo prolongatis ; elytris parum elongatis, antice et postice attenuatis, alutaceis, minute, sparse, pro parte non regulariter punctatis, sutura presuturalis distincta ; tibiis anticis sinuatis, apice parum longe bidentatis. Long. 6 mill. Madagascar. — Voisin de *tenuipunctatus* Frm., élytres moins courts et ponctuation différente.

Microphaechroops n. gen. Corpus oblongo-subovatus, minutus; capite antice angulato-prolongato, mandibulis prominulis, elongatis, apice bidentatis, oculis globulosis, minute incisus; clava antennarum subovata; thorace crenulato; elytris fortiter marginatis; tibiis anticis dentato crenulatis, apicé bidentatis: Genre d'*Hybosorinæ* ayant le faciès de *Phoeochroops* Can. ou de *Phaeochridius* Lansb., remarquable et distinct, à première vue, par sa petite taille et la structure de la tête. Ce nouveau genre est établi pour l'espèce suivante.

Microphaechroops hirsutus n. sp. Oblongo-subovatus, subconvexus, nitidus, supra sat longe hirsutus, testaceus, supra medio brunnescens, capite thoraceque fortiter, parum sparse, punctatis, illo parum breve, antice attenuato; scutello subtriangulare; elytris parum elongatis, lateraliter postice subarcuatis, dense, late, sat irregulariter punctatis. Long. 5 mill. Tonkin.

Je possède, du Tonkin, une autre petite espèce, qui ressemble beaucoup à la précédente, avec une forme plus raccourcie, subovalaire, mais dont la tête est différente, par ses yeux non visibles en dessus; ceux-ci, petits, sont cachés sous une petite saillie latérale postérieure et paraissent entiers, les mandibules sont grandes, larges, subarquées, non bifides. Pour cette espèce, l'établissement d'un genre nouveau me paraît nécessaire et je propose de lui donner le nom de **Mimocoelodes** (1) en le plaçant provisoirement près de *Coelodes* Lac.

Mimocoelodes minutus n. sp. Subovatus, parum convexus, nitidus, lateraliter ciliatus, supra sat longe hirsutus, testaceus, elytris medio paulo brunneis; capite thoraceque fortiter, parum dense, punctatis, illo breve et

(1) Je reparlerai ultérieurement de ce genre, quand j'en aurai vu plusieurs exemplaires.

lato, lateraliter arcuato et subcrenulato, antice paulo attenuato ; scutello subtriangulare ; elytris sat brevibus et latis, subarcuatis, marginatis, dense, late, pro parte regulariter punctatis, lateraliter longe ciliatis ; tibiis anticis dentato-crenulatis, apice longe bidentatis. Tonkin. Long. 4 mill.

Neoclerus notatus n. sp. Longe hirsutus, fere opacus, rufus, pro parte brunnescens, antennis ad basin et apice pedibusque pallidioribus, elytris rubro-testaceis, in singulo signaturis tribus nigris ornatis : macula rotundata prescutellaris, fascia mediana et fascia postmediana reductis ; capite elongato, elongato-punctato, oculis fere integris ; thorace fortiter et dense punctato, medio paulo impresso, postice paulo strangulato ; elytris latis et brevibus, fortiter et sparse punctatis ; pedibus validis. Long. 4 mill. Hoa-Binh. — Voisin de *5-maculatus* Gorh., s'en distingue, à première vue, par les dessins noirs des élytres différents.

Neohydnus javanus n. sp. Parum elongatus, nitidus, albo pubescens et hirsutus, niger, supra olivaceus, elytris viride-cyanescentibus, membris pallidis, capite thorace latiore, oculis grandis, prominulis ; thorace breve, antice dilatato-subrotundato, parum, pro parte fortiter, punctato ; elytris subparallelis, apice reducte attenuatis, fortiter et dense punctatis. Long. 4 mill. Java. — Voisin de *pallipes* Kr., en diffère par le front un peu bombé, la coloration olivâtre de l'avant-corps et d'un vert bleuté sur les élytres.

Bruchus albonotatus n. sp. Oblongus, rufus, pro parte albo pubescens, thorace medio et lateraliter albo vittato, elytris albo notatis ; capite elongato ; antennis rufis, brevibus, apice paulo dilatatis ; thorace parum breve, obconico, disperse punctato, lobo prescutellare lato, medio

subsulcato ; scutello elongato, albo ; elytris thorace paulo latioribus, lateraliter subarcuatis, apice subrotundatis, minute striatis ; pygidio prominulo, ad basim et medio densiore pubescente ; pedibus posticis sat validis, femoribus muticis, tibiis carinatis. Long. 4-4,5 mill. Sennar au Soudan (British Museum et coll. Pic). — Voisin de *centromaculatus* All., en diffère, à première vue, par le revêtement élytral, qui offre de nombreuses macules allongées blanches, mais pas de macules foncées.

Philus longipennis n. sp. ♀. Elongatus, nitidus, griseo-pubescent, testaceus, oculis nigris ; capite dense ruguloso-punctato, in vertice sulcato ; thorace breve, parum lato, postice dilatato-subarcuato et marginato, minute, diverse, pro parte sparse, punctato ; elytris longissimis, postice attenuatis, parum fortiter sat dense punctatis, in singulo diverse 4 costulatis. Long. 18 mill. Cambodge. — Paraît différer de *costatus* Gah. (ex description) par le prothorax autrement ponctué et élargi en arrière ; en diffère peut-être aussi par les élytres plus longs.

Parastrangalis valeria n. sp. Angustatus, parum nitidus, rufo-testacèus, capite antice et postice nigro notato, palpis, antennis, articulo 1^o pro parte rufo excepto, pedibus pro parte pygidioque nigris, elytris rufo-testaceis, apice nigris, ad medium externe nigro maculatis et antice lateraliter nigro lineatis, sutura antice nigra ; capite elongato, oculis valde dilatatis ; thorace elongato, postice latiore, lateraliter sinuato ; elytris postice angustatis, apice truncatis, non spinosis ; pedibus 4 anticis testaceis, tarsis et geniculis intermediis nigris, pedibus posticis nigris, femoribus ad basin late testaceis. Long. 20 mill. Tonkin. — Voisin de *Aurivillei* Pic, en diffère par la suture brièvement marginée de noir à la base, la présence, sur les élytres, d'une macule médiane prolongée antérieure-

ment en ligne, les cuisses postérieures largement noires à l'extrémité.

Strangalia tonkinensis n. sp. Parum elongatus, postice attenuatus, pro parte griseo-argenteo pubescens, niger, abdomine pro parte femoribusque testaceis, elytris pro parte fulvo-luteis, pro parte nigris, antennis nigris, articulis 8-10 albis, his elytris paulo superantibus; capite sat elongato, oculis valde prominulis; thorace elongato, antice paulo strangulato, postice lateraliter sub-sinuato, angulis posticis nullis, diverse punctato; elytris thorace sat latioribus, postice attenuatis, apice truncatis, diverse, pro parte sparse, punctatis, supra deplanatis et ad suturam postice paulo impressis, fulvo-luteis, nigro marginatis, lateraliter sat late nigris et ad humeros rufo-lineatis, externe ad basin, ad et post medium, rufo-maculatis. Long. 11 mill. Tonkin. — Très voisin de *Jeanvoinei* Pic, s'en distingue par l'étranglement antérieur du prothorax moins marqué, celui-ci plus robuste en arrière, moins bombé en avant, et les dessins latéraux des élytres différents.

Debilissa s. g. nov. **Kurseongia**. Antennarum articulis 5 et sequentibus paulo crassioribus, capite parum elongato facile distinguendus. — Sous-genre établi pour l'espèce nouvelle suivante :

Kurseongia Laboissierei n. sp. Elongatus, nitidus, paulo griseo pubescens, niger, articulis 4 primis antennarum, thorace, scutello, elytris, his apice nigris, pedibusque anticis testaceis; capite parum elongato, thorace non latiore; thorace elongato, postice paulo dilatato, supra æquale, ad basin paulo strangulato, sat fortiter et sparse punctato; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, ad medium paulo strangulatis, apice subtruncatis, in disco costulatis, sat fortiter et parum dense punctatis; pe-

dibus anticis brevibus, intermediis et posticis longioribus, femoribus clavatis. Long. 9 mill. Indes : Kurseong (Don de Laboissière).

Microdebilissa diversipes n. sp. Elongatus, opacus, elytris subnitidis, rufo-testaceus, abdomine pedibusque posticis pro majorè parte nigris ; capite parum elongato, antice dilatato ; antennarum apice brunneis, elongatis, articulo 1° paulo crasso ; thorace sat breve, non transverso, postice fortiter arcuate-impresso et medio gibbuloso ; elytris thorace paulo latioribus, ad medium minute strangulatis, apice separatum subrotundatis, externe subcostulatis, dense sat fortiter punctatis ; pedibus 4 anticis testaceis, diverse brevibus, posticis nigris, femoribus ad basin late testaceis, his longissimis, apice paulo dilatatis, tibiis elongatis, curvatis. Long. 6 mill. Indes : Kurseong. — Diffère de *minuta* Pic par le premier article des antennes moins épais et plus clair, le prothorax autrement impressionné, les cuisses postérieures moins élargies.

Xylotrechus diversepubens n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, membris piceis, pro parte rufis ; capite unicarinato ; antennis sat gracilibus, piceis, apice rufis, articulo ultimo impresso ; thorace elongato, lateraliter regulariter subarcuato, granuloso ; scutello albo marginato ; elytris subparallelis, parum elongatis, sparse griseo pubescentibus, apice aurantiaco pilosis, antice arcuate, post medium transverso et recte albo fasciatis ; infra corpore pro parte dense albo, pedibus pro parte piceis, pro parte rufis. Long. 9 mill. Tonkin. — Ressemble à *djoukoulanus* Pic par ses dessins, très distinct par sa forme subparallèle, le prothorax moins robuste, les élytres non marqués de roux, mais garnis de poils orangés à l'extrémité.

X. paulocarinatus n. sp. Parum elongatus, postice

paulo attenuatus, niger, dense griseo luteo pubescens, signaturis nigris ornatus, membris rufescentibus ; capite parum distincte unicarinato ; antennis parum brevibus, sat gracilibus ; thorace parum elongato, lateraliter subarcuato, transverse nigro quinque maculato ; elytris parum elongatis, apice truncatis, in singulo antice nigro (2,1) trimaculatis, ad medium reducte et transverse nigro fasciatis, lateraliter pro majore parte nigro marginatis. Long. 10 mill. Chapa (acquis chez Clermont). — Voisin de *longithorax* Pic, de forme plus allongée, avec les dessins noirs différents, les pattes plus claires.

Perissus chapaanus n. sp. Parum elongatus, niger, luteo pubescens, signaturis nigris ornatus ; capite parum lato, luteo pubescente ; antennis distantibus, gracilibus, parum brevibus, griseo pubescentibus ; thorace subglobuloso, parum lato, luteo pubescente, medio nigro maculato ; elytris parum elongatis, postice paulo attenuatis, apice truncatis, luteo pubescentibus, post humeros late et arcuate nigro maculatis, postice externe nigro maculatis et ad medium arcuate nigro fasciatis ; pedibus luteo pubescentibus et longe pilosis. Long. 10 mill. Chapa. — Espèce pouvant prendre place près de *ruficornis* Pic et distincte par le prothorax moins robuste, maculé, et les dessins différents des élytres.

Rhaphuma 4-maculata v. nov. subobliterata. Elongatus, subparallelus, niger, luteo sat uniformiter pubescens, elytris vage membrisque rufescentibus ; thorace parum elongato, in disco vage nigro bimaculato ; elytris signaturis brunneis reductis vage notatis. Chine : Yunnan. — Diffère de *4-maculata* Pic par le prothorax un peu plus long, non 4 maculé de noir et le revêtement presque uniforme des élytres, sur fond un peu roussâtre.

Epepeotes pauloperforatus n. sp. Elongatus, niger,

fulvo pubescens, elytris diverse, sparse et irregulariter glabro perforatis ; antennis longissimis, concoloribus, scapo elongato ; thorace breve, sat lato, lateraliter longe spinoso, postice paulo granuloso-punctato ; elytris postice attenuatis, ad basin perforato-punctatis, aliquot granuloso punctatis, diverse glabro impressis, apice truncatis ; mesosterno medio minute tuberculato. Long. 18-20 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *inbasalis* Pic, très distinct par la sculpture des élytres, le scape plus long.

E. laosensis n. sp. Elongatus, piceus, fulvo aut luteo pubescens, elytris griseo-luteo pubescentibus, ad basin triangulariter brunneo notatis, post medium brunneo fasciatis, fascia lateraliter dilatata, sparse diverse brunneo subfoveolatis aut punctatis ; antennis longissimis, pro parte rufescentibus, scapo elongato ; thorace breve, lateraliter longe spinoso ; elytris postice attenuatis, apice truncatis ; mesosterno medio paulo elevato ; tibiis anticis intus sinuatis, apice dilatatis. Long. 22 mill. Laos. (ex Vitalis). — Espèce très distincte par ses élytres conjointement fasciés et maculés diversement de brun.

Psaromaia undulata n. sp. Oblongus, postice paulo attenuatus, nitidus, niger, dense griseo aut fulvo pubescens, elytris fulvis, transverse et diverse griseo undulato-fasciatis, fascia prima ad humeros dilatata, ante apicem et apice minute albo notatis ; antennis corpore paulo superantibus ; thorace breve et lato, lateraliter longe spinoso ; elytris sat latis et parum brevibus, postice attenuatis et apice subrotundatis, diverse et sparse punctatis, ad basin fortius et pro parte granuloso-punctatis ; pedibus parum elongatis, tibiis anticis et intermediis fere rectis ; intermediis fere incisus ; abdomine griseo brunneo maculato ; mesosterno antice valde tuberculato. Long. 20 mill. Chapa. — Espèce très distincte par son système de coloration.

Pothyne birmanica n. sp. Sat robustus, parum elongatus, postice paulo attenuatus, niger, albo vittatus ; capite in vertice albo vittato ; antennis nigris, longissimis, articulis 3-5 ad basin albidis ; thorace subcylindrico, supra albo trivittato, lateraliter externe et antice reducte albo vittato et infra late albo vittato ; elytris sat brevibus, sutura alba, in singulo albo trivittatis, vitta interna reducta et parum indicata, postice oblitterata ; infra corpore lateraliter et medio late albo vittato ; pedibus validis et brevibus. Long. 13 mill. Birmanie. — A *placer* près de *7-lineata* Aur., en diffère par les bandes différentes, notamment au nombre de 3 sur chaque élytre.

Falsomesosella nigronotata n. sp. Oblongus, parum nitidus, pro parte densiore griseo aut luteo pubescens, niger, membris albo annulatis ; capite medio excavato et sulcato ; antennis parum validis, apice attenuatis, scapo infra apice paulo prominulo ; thorace breve, parum lato, lateraliter arcuato, minute et dense punctato, antice medio paulo prominulo ; elytris sat latis et brevibus, postice paulo marginatis, apice attenuatis et subtruncatis, sat fortiter et dense punctatis, griseo aut luteo pubescentibus et nigro punctatis, ante et post medium late nigro et glabro notatis. Long. 8 mill. Hoa-Binh. — Voisin de *minor* Pic, en diffère par la forme plus robuste, la coloration plus foncée et les larges macules noires des élytres.

Sodus tenuelvittatus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, brunneo pubescens, elytris signaturis albis ornatis ; antice diverse albo fasciatis et postice tenue et sinuate albo fasciatis, articulis 4 et sequentibus antennarum ad basin late albo annulatis ; thorace parum robusto, supra inæquale ; élytris sat brevibus, postice attenuatis, diverse punctatis ; infra corpore pedibusque sat dense albo pubescentibus. Long. 9 mill. Chapa. — Voisin de *Bedoci*

Pic, en diffère par les antennes nettement annelées, les élytres à bandes graciles sinuées, les antérieures se joignant en partie, et même complètement sur les côtés.

Ropica bituberculatithorax n. sp. Oblongus, nigropiceus, pro parte rufescens, diverse griseo aut luteo pubescens; antennis sat brevibus, apice attenuatis, albo annulatis; thorace brevis et lato, in disco minute bituberculato, dense punctato; elytris thorace latioribus, sat elongatis, postice valde attenuatis, fortiter punctatis, in disco postice medium albo notatis, in disco diverse bicosculatis, ad basim et postice nigro cristatis; pedibus multicoloratis. Long. 5 mill. Saïgon. — Cette petite espèce est caractérisée par le prothorax bituberculé conjointement à la structure élytrale.

Le **R. intuberculata** mihi, du Tonkin, est plus parallèle et courtement atténué à l'extrémité avec les antennes un peu plus longues, presque de la longueur du corps, le prothorax non tuberculé; chaque élytre est muni d'une petite crête basale non fasciculée de crins noirs et ces organes ne sont pas fasciculés postérieurement.

Tetraonyx bicoloriceps n. sp. Elongatus, niger, nitidus, capite postice, thorace, scutello, coxis femoribusque ad basin late testaceis; elytris nigro-cyanescentibus; thorace brevis et lato, lateraliter non inciso, postice paulo carinato; elytris opacis, thorace valde latioribus, elongatis, apice attenuatis, in disco vage costulatis. Long. 16 mill. Colombie. — Diffère de *cyanipennis* Haag. au moins par la tête testacée sur sa partie postérieure.

T. peruvianus n. sp. Oblongus, nitidus, niger, capite post oculos et thorace circa rufis, elytris luteis, ad basin nigro elongato-bimaculatis et postice late nigro maculatis; membris nigris, femoribus ad basin testaceo maculatis; capite thoraceque fortiter et sparse punctatis, illo brevis

et valde transverso, lateraliter paulo inciso ; elytris thorace valde latioribus, sat brevibus, inæquale et sparse punctatis. Long. 15 mill. Pérou. — Voisin de *argentinus* Pic, mais plus grand et plus robuste avec le prothorax plus court, la macule postérieure des élytres plus grande.

T. 6-guttatus Ol. v. nov. **biundulatus**. Noir, avec les élytres ornés de deux fascies plus ou moins ondulées fauves. Panama.

T. brevenotatus n. sp. Oblongus, parum nitidus, testaceus, capite in vertice et thorace medio brunneo-piceo maculatis, antennis, femoribus et tibiis apice, tarsisque nigris ; capite diverse et sparse punctato ; thorace breve et lato, antice strangulato, lateraliter marginato, sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, apice attenuatis, sat elongatis, in disco subcostulatis. Long. 8 mill. Costa-Rica. — Voisin de *fulvus* Lec., en diffère par l'avant-corps maculé et l'aspect moins brillant.

T. vittatus Haag. Espèce variable avec les variétés nouvelles suivantes, du Paraguay: var. **bisbilineatus**, à prothorax roux, immaculé, élytres testacés avec 2 bandes foncées longitudinales sur chaque élytre ; var. **pallidicolor**, à prothorax roux et élytres presque uniformément testacés.

Mordella viridis n. sp. Antice robustus, postice valde attenuatus, niger, viride pubescens et signaturis nigris ornatus ; capite medio et thorace multi nigro signatis, elytris ad scutellum nigro maculatis, ad humeros et postice bireducte nigro lineatis, ad medium lineate et maculate nigro signatis, signaturis junctis ; capite et thorace, illo latiore, valde transversis ; elytris thorace angustioribus, attenuatis, apice rotundatis ; pygidio sat breve ; pedibus posticis validis et brevibus. Long. 5 mill. Brésil. —

Voisin, par son revêtement vert, de *æruginosa* Chp., mais élytres plus courts et à dessins noirs différents.

Copodita multiguttata n. sp. Elongatus, nitidus, flavus, infra corpore, pro parte nigro, antennis nigro annulatis ; capite inter oculos et thorace diverse et multi nigro notatis, illo elongato, antice valde dilatato subrotundato, ad basin fere recto, supra inæquale et dense punctato ; elytris multi nigro-piceo notatis, maculis pro parte lineato dispositis, elytris indistincte costatis, minute et dense punctatis. Long. 8 mill. Haïti (ex Wolcott, in British Museum et coll. Pic). — Espèce caractérisée par sa coloration pâle avec le dessus du corps multimaculé de foncé. Sans doute voisin de *lineata* Wat.

C. metallica n. sp. Nitidus, sparse griseo pubescens, metallicus, cyanescens aut viridescens, capite antice, palpis antennisque nigris ; capite robusto, parum breve, fortiter sat sparse punctato, oculis validis, mandibulis apice minute bidentatis ; articulo ultimo palparum subcultriforme ; antennis sat elongatis, articulo 2° sat breve, 3° valde longiore, ultimo ante apicem paulo inciso aut strangulato ; thorace parum elongato, antice paulo dilatato, ad basin medio paulo impresso, sat fortiter et dense punctato ; elytris thorace paulo latioribus, sat elongatis, postice paulo attenuatis et apice subrotundatis, incostatis, dense ruguloso-punctatis ; pedibus parum validis. Long. 5,5-6 mill. Haïti (ex Wolcott, in British Museum et coll. Pic). — Espèce caractérisée par sa coloration foncée métallique.

Physcius grandis n. sp. Elongatus, nitidus, griseo pubescens, nigro-piceus, elytris castaneis, articulo 1° antenarum, palpis pedibusque testaceis ; capite grande, dense punctato, antennis crassis et brevibus ; thorace parum transverso, medio lateraliter transverse impresso,

postice foveolato ; elytris thorace latioribus, elongatis. minute et dense punctatis. Long. 5 mill. Bolivie. — Voisin de *curticornis* Pic, plus grand, prothorax plus large et nettement impressionné, élytres nettement déprimés vers la suture.

Polypria signata n. sp. Rufus, membris testaceis, elytris in singulo anterius nigro lineatis, linea presuturalis, post medium bitransverse undulata, postice suturalis et ad apicem recurvata. Long. 7 mill. Costa-Rica. — Voisin de *zigzaga* Pic, dessins noirs longitudinaux autrement disposés et élytres moins longs.

P. crux rufa v. nov. **nigrocincta**. Elytris rufis, nigrocinctis et post medium nigro fasciatis, sutura antice rufa, postice picea. Brésil.

Xeuxes diversicornis n. sp. Elongatus, subparallelus, griseo pubescens, parum nitidus, niger, capite antice membrisque rufis ; capite dense ruguloso-punctato, inter antennas subarcuate sulcato ; antennis sat brevibus, extus subpectinatis, intus paulo dentatis, articulis primis brevibus, 4° elongato ; thorace parum breve et lato, antice attenuato, medio subtruncato, medio sulcato, postice lateraliter late impresso, sat fortiter et sparse punctato ; elytris thorace non latioribus, subparallelis, apice paulo attenuatis, minute striato-punctatis, intervallis deplanatis ; pedibus sat gracilibus. Long. 5 mill. R. Argentine : Rio-Salado. — Je place provisoirement cette espèce, remarquable par sa structure antennaire, dans le genre *Xeuxes* Chp.

Pseudothisias n. gen. Corpus elongatus ; capite breve, oculis latis, integris ; antennis brevibus, apice dilatatis, ante oculos insertis ; thorace transverso, lateraliter postice submarginato, supra impresso ; elytris thorace latio-

ribus, elongatis, epipleuris arctis, postice indistinctis ; coxis anticis oblongo-ovatis, approximatis ; mesosterno sat angustato, coxis intermediis oblongis ; femoribus parum crassis, unguibus dentatis. — Ce nouveau genre, établi pour l'espèce qui suit, peut se placer près de *Thisias* Chp. ; il en diffère, à première vue, par les antennes plus courtes, insérées presque à découvert, les yeux plus larges, le prothorax largement impressionné sur le disque.

Pseudothisias bicolor n. sp. Elongatus, parum nitidus, minute griseo pubescens, niger, thorace rufo, pedibus pro parte rufis ; capite thoraceque dense ruguloso-punctatis, illo breve et lato, supra medio late et transverse impresso, postice minute biimpresso, angulis rotundatis ; elytris thorace latioribus, elongatis, postice paulo dilatatis, apice attenuatis, minute et dense punctatis, sutura griseo pubescens ; pedibus validis, femoribus sat crassis, nigris, tibiis aut tarsis pro parte brunnescentibus, femoribus late rufis. Long. 6 mill. Hoa-Binh.

Lopholagria amæna v. nov. atricolor. Totus niger. Rhodesia.

L. sanghana n. sp. Oblongo-elongatus, castaneus, pro parte rufescens, parum pilosus, diverse punctatus, elytris pro parte plicatis ; capite sat elongato ; thorace parum lato, lateraliter antice subarcuato, medio sat longe impresso, dense punctato ; elytris parum elongatis, lateraliter ad medium paulo dilatatis, apice attenuatis et subacuminatis. Long. 12 mill. Congo. — Diffère, à première vue, de *amæna* Fahr. par le sillon du prothorax moins rapproché du bord des élytres, la forme différente et un peu plus longue des élytres.

L. Crampeli n. sp. Oblongus, robustus, valde pilosus, rufescens, diverse, pro parte fortiter, punctatus, elytris

pro parte plicatis, rufis, antennis pedibusque pro parte nigris ; capite sat breve et robusto ; thorace breve et lato, lateraliter antice subarcuato, medio sat longe impresso, dense punctato ; elytris latis et parum elongatis, postice minute latoribus, apice attenuatis. Long. 13 mill. Congo : Fort Crampel. — Espèce distincte de *amæna* Fahr. par la forme plus robuste du prothorax, les pattes bicolores, la taille plus avantageuse.

Acritolagria luteolineata n. sp. Oblongus, parum nitidus, griseo pubescens, thorace medio luteo lineato, niger, abdomine pro parte elytrisque rufescentibus ; capite sat breve et robusto, fortiter punctato ; articulo 3° antennarum sat elongato, 4° paulo brevior, 5° lato, sequentibus latis et diverse brevibus, ultimo parum elongato, apice attenuato ; thorace breve sat lato, lateraliter subarcuato, diverse, pro parte fortiter et dense, punctato ; elytris latis, sat elongatis, subparallelis, postice attenuatis, dense punctatis et multiplicatis. Long. 13 mill. Fort Sibut. Voisin de *fulvopilosa* Frm., mais forme moins trapue, élytres à sculpture moins forte, membres entièrement foncés, etc.

Lobopoda saladoensis n. sp. Oblongus, antice et postice attenuatus, nitidus, paulo fulvo pubescens, castaneus, capite antice, thorace, scutello, elytris apice, abdomine membrisque rufis ; capite fortiter et sparse punctato, oculis paulo approximatis ; thorace breve et lato, antice attenuato, supra postice quinque (2, 1, 2) impresso, fortiter et sparse punctato ; elytris thorace non latoribus, parum elongatis, postice valde attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis diverse subconvexis et punctatis ; pedibus sat validis. Long. 10 mill. Rép. Argentine : Rio-Salado. — Très voisin de *grandicollis* Pic, en diffère par la forme plus robuste, le prothorax moins court, orné

de 2 impressions discales prémédianes, la ponctuation moins forte des stries, etc.

L. angustata n. sp. Angustatus, subparallelus, postice attenuatus, longe luteo pubescens, parum nitidus, castaneus, membris rufescentibus; capite diverse, pro parte fortiter, punctato, oculis parum distantibus; thorace breve et lato, antice attenuato, sparse pupillato-punctato, postice biimpresso et medio sulcato; elytris thorace non latioribus, elongatis, postice attenuatis, sat minute striato-punctatis, intervallis subdepressis, punctatis; pedibus parum validis. Long. 9 mill. Rio-Salado. — Caractérisé par sa forme étroite et allongée; à placer près de *catopina* Perty.

La **L. minima** mihi, du Brésil, dont la ponctuation de l'avant-corps est analogue à la précédente, en est très distinct par la taille moindre, la forme moins étroite, présentant sa plus grande largeur aux épaules, les yeux rapprochés, les élytres très atténués et plus fortement striés, à membres et écusson d'un testacé jaunâtre, suture testacée.

L. Wagneri n. sp. Elongatus, subparallelus, antice et postice breve attenuatus, luteo pubescens, parum pubescens, nigro-piceus aut brunneus, aliquot paulo rufescens, membris rufis; capite sat fortiter plus minusve dense punctato, oculis ♂ approximatis, ♀ parum distantibus; thorace breve, sat lato, sat fortiter et dense punctato, postice triimpresso et medio diverse sulcatulo; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, parum fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, punctatis; pedibus parum validis, tibiis anticis ♂ rectis, ad basin subangulatis. Long. 10-12 mill. Rio Salado. — Voisin de *Drakei* Pic, en diffère par le prothorax plus droit sur les côtés postérieurs, les élytres moins fortement striés avec les intervalles moins convexes.

L. chacoensis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, longe luteo pubescens, parum nitidus, castaneus, capite antice membrisque rufis ; capite fortiter sat sparse punctato, oculis fere junctis ; thorace parum breve, sat lato, antice attenuato, dense punctato-pupillato, postice triimpresso et medio subsulcato ; elytris thorace non latioribus, elongatis, postice attenuatis, parum fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, antice pro parte subdeplanatis, punctatis ; pedibus parum validis. Long. 8 mill. Rép. Argentine : Gran Chaco. — Voisin de *punctaticeps* Pic, en diffère par la ponctuation de la tête espacée, la forme plus allongée, la ponctuation plus rapprochée et moins large du prothorax.

La **var. nov. diversa**, de Rio-Salado, est un peu moins étroite, de coloration un peu noirâtre en dessus, avec la ponctuation moins rapprochée et en partie plus petite du prothorax.

L. Pauli n. sp. ♂. Elongatus, postice valde attenuatus, luteo pubescens, parum nitidus, niger, capite antice, antennis ad basin femoribusque pro parte rufis ; capite sat minute et sparse punctato, oculis fere junctis ; thorace parum breve, sat lato, antice attenuato, diverse, pro parte minute et sparse, punctato, postice triimpresso ; elytris thorace paulo latioribus, elongatis, postice valde attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, punctatis ; pedibus sat validis. Long. 10 mill. Brésil : Sao-Paulo. — Voisin de *Claveri* Pic, en diffère, à première vue, par le prothorax autrement et plus finement ponctué et les membres plus foncés.

La **L. semihirsuta** mihi, du Brésil, voisine de la précédente, est plus parallèle, en partie hirsute avec les yeux un peu écartés, le prothorax à ponctuation pupilleuse et espacée, à impression médiane non large, mais étroite,

les intervalles plats en avant, à coloration générale d'un brun roux, les élytres et les membres étant plus clairs et le dessous en partie de poix.

L. ruficolor n. sp. Angustatus, postice attenuatus, griseo hirsutus, parum nitidus, rufus, antennis apice brunneis ; capite diverse punctato, oculis sat valde distantibus ; thorace fere subquadrato, antice attenuato, sparse pupilloso-punctato, punctis pilosis ; elytris thorace parum latioribus, elongatis, postice attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, punctatis ; pedibus gracilibus. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *parallela* Pic, en diffère par la forme plus étroite et plus allongée, la ponctuation moins forte des stries.

L. approximata n. sp. ♂. Angustatus, postice valde attenuatus, luteo-fulvo pubescens, nitidus, niger, pro parte, piceus, capite sat dense punctato, oculis fere contigus ; thorace breve et lato, sat fortiter et dense punctato, postice triimpresso ; elytris thorace parum latioribus, elongatis, postice valde attenuatis, sat fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, punctatis ; pedibus parum validis, tibiis anticis intus subtriangulariter dilatatis. Long. 12 mill. Brésil. — Voisin de *attenuatipennis* Pic, mais aspect plus brillant, forme plus étroite, prothorax moins transversal, élytres à stries plus profondes.

Borboesthes vicinus n. sp. Elongatus, nitidus, luteo pubescens, rufescens, capite thoraceque minute sat dense punctatis, illo breve et lato, antice attenuato, postice sinuato et triimpresso ; elytris thorace parum distincte latioribus, elongatis, postice attenuatis, parum fortiter striato-punctatis, intervallis diverse latis, subconvexis, multipunctatis ; pedibus simplicibus. Long. 10 mill. Chine : Yunnan. — Ressemble à *tenuistriata* Frm., en diffère

par le dessus moins convexe, le prothorax à ponctuation plus forte et plus dense.

B. minor n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, luteo-pubescent, rufo-testaceus, capite thoraceque paulo-brunneis, pedibus pallidioribus, capite thoraceque sat fortiter et dense punctatis, illo breve et lato, lateraliter antice subarcuato, externe ciliato, ad basin subsinuato ; elytris thorace parum distinctè latioribus, subparallelis, postice attenuatis, parum fortiter striato-punctatis, intervallis non deplanatis, minute punctatis ; pedibus simplicibus. Long. 7 mill. Yunnan. — Voisin de *daosus* Pic, mais prothorax plus large en avant, avant-corps plus foncé, forme plus parallèle.

Allecula angustatissima n. sp. Angustatus, nitidus, griseo pubescens, rufus, pro parte brunneo-castaneus, membris nigris, antennis ad basin, femoribus ad basin geniculisque testaceis ; capite diverse, pro parte dense, punctato ; thorace parum elongato, sat angustato, antice subarcuato, minute sat sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, postice longe attenuatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute punctatis ; pedibus gracilibus, tibiis anticis intus medio dentatis. Long. 12 mill. Yunnan. — Voisin de *elongatissima* Pic, mais plus étroit, élytres sans reflets métalliques, plus finement ponctués.

Gonocnemis Maublanci n. sp. Elongatus, parum nitidus, paulo pubescens, niger ; antennis validis ; thorace parum breve, plus minusve lato, lateraliter antice subarcuato, supra minute et multi impresso, sat fortiter et dense punctato-plicato ; elytris thorace sat latioribus, postice attenuatis, dorso late sulcatis, sulcis fundo late punctatis, intervallis minute costatis. Long. 11-13 mill. Gabon (coll. Pic et Maublanc). — Voisin de *abyssinicus* Pic, en diffère, à première vue, par le prothorax moins

étroit et plus fortement ponctué, la ponctuation plus forte des élytres.

G. Le Testui n. sp. Oblongus, subopacus, parum pubescens, niger; antennis gracilibus; thorace parum breve, sat lato, antice attenuato, lateraliter paulo crenulato, supra fere æquale, fortiter et dense punctato-plicato; elytris thorace sat latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, striato-punctatis, intervallis parum latis et subconvexis, pro parte granulosis. Long. 10 mill. Gabon (coll. Pic et Maublanc). — Espèce caractérisée par la sculpture du dessus du corps.

Psydyus substriatus n. sp. Oblongus, nitidus, nigro-subolivaceus, pedibus cœruleo-violaceis, antennis nigris, his brevibus; capite parum breve, minute et sparse punctato; thorace breve et lato, sat fortiter et sparse punctato; elytris thorace valde latioribus, lateraliter sinuatis, apice attenuatis et subacuminatis, marginatis, minute striato-punctatis, intervallis latis, deplanatis; tibiis apice luteo pilosis. Long. 12 mill. Tonkin. — Voisin de *violaceipes* Frm., tête moins courte, prothorax plus largement explané latéralement, à ponctuation plus forte, etc.

Diabolicobates n. gen. Corpus oblongo-elongatus, apterus; thorace non marginato, antice longe bicornuto; antennis elongatis, articulis tribus ultimis dilatatis; elytris ad basin attenuatis, tuberculatis; pedibus parum elongatis; prosterno postice paulo declive et tuberculato, mesosterno late excavato, metasterno breve. — Ce nouveau genre, établi pour l'espèce nouvelle qui suit, me paraît devoir se rapprocher du genre *Cryptobates* Fairm.; il est remarquable et distinct au premier coup d'œil par le prothorax muni antérieurement, de chaque côté, d'une longue corne, un peu recourbée.

Diabolicobates cornutus n. sp. Plus ou moins oblong-allongé (élytres parfois plus élargis avec les cornes moins longues, sans doute ♀), noir terne, parfois dessous orné par places de poils courts, plus ou moins rugueux sur l'avant-corps avec des petites granules brillantes, élytres ornés de tubercules émoussés de grosseurs diverses et irrégulièrement disposés, ceux-ci sont subarqués sur les côtés, atténués et un peu déclives à l'extrémité ; pattes ponctuées, les points émettant des poils courts à l'état frais. Long. 13-19 mill. Annam : Dalat.

Campsiomorpha spectabilis v. nov. **formosana**. Dessus verdâtre, avec çà et là des parties pourprées, élytres à stries vertes, mates et intervalles verdâtres brillants, bordés de deux lignes étroites pourprées, pattes et dessous en partie verts et en partie pourprés, genoux et tarses bleus. Formose. — Variété caractérisée par la particulière coloration des élytres, qui présentent de très nombreuses lignes longitudinales pourprées.

Cerocamptus dalatensis n. sp. Satis elongatus, nitidus, nigro-æneus, scutello, pedibus et infra corpore pro parte purpureis, antennis nigris, gracilibus, articulis 4 ultimis paulo latioribus ; capite thoraceque diverse, pro parte minute et sparse punctatis, illo parum breve, sat lato, antice attenuato, angulis anticis subrotundatis ; elytris thorace valde latioribus, subparallelis, apice attenuatis, minutissime striatis, intervallis latis, deplanatis. Long. 27 mill. Annam : Dalat. — Distinct, à première vue, de *angulicollis* Frm. par les angles antérieurs du prothorax non avancés et subarrondis.

Camariomorpha multilineolata n. sp. Oblongo-elongatus, parum convexus, nitidus, æneus, pro parte purpureo-tinctus, elytris viridi-æneis, multi purpureolineatis ; articulis 4 ultimis antennarum paulo dilatatis, 8° latiore ;

capite diverse et dense punctato, medio arcuate subovato ; thorace breve et lato, antice paulo attenuato, lateraliter subsinuato, angulis anticis rotundatis, postice paulo triimpresso, sat fortiter et sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, postice paulo dilatatis, apice attenuatis, ad suturam minute dentatis, parum fortiter striato-punctatis, intervallis minute punctatis, latis, ad basin subconvexis, medio deplanatis, postice pro parte abbreviatis et inæqualibus ; segmentibus abdominis lateraliter diverse impressis. Long. 23 mill. Java. — Cette espèce, caractérisée par la présence de multiples lignes pourprées sur les élytres et le prothorax à angles antérieurs arrondis, avec le 8^e article des antennes élargi, peut prendre place près de *clavipes* Geb.

Camaria singularicollis n. sp. Elongatus, nitidus, nigro-æneus ; antennis parum elongatis, gracilibus ; capite parum elongato, minute punctato, postice bifoveolato ; thorace minutissime punctato, marginato, breve et lato, lateraliter fortiter sinuato, angulis anticis externe dilatatis, rotundatis ; elytris thorace valde latioribus, antice oblique attenuatis, apice attenuatis, instriatis, minutissime lineato-punctatis, intervallis latis, deplanatis ; tibiis intermediis apice intus ciliatis. Long. 25 mill. Equateur. — Voisin de *undulicollis* Geb. par la forme de son prothorax, en diffère, à première vue, par la très fine ponctuation des élytres.

C. brevespinosa n. sp. Sat elongatus, nitidus, rufobrunneus, pedibus pro parte nigris ; antennis apice paulo dilatatis ; capite breve, minute punctato, oculis sat distantibus ; thorace breve, sat lato, lateraliter fere recto, pro majore parte marginato, antice medio simplice, minute et sparse punctato ; elytris thorace valde latioribus, antice valde convexas, subparallelis, postice attenuatis et apice breve spinosis, fortiter striatis, striis minute punctatis, in-

tervallis convexis, minutissime punctatis. Long. 32 mill. Cayenne. — Peut se placer près de *spinipennis* Cast., très distinct par ses élytres fortement striés et sa coloration non foncée.

C. incerta n. sp. Elongatus, subparallelus, parum convexus, nitidus, olivaceo-æneus, membris et infra corpore pro parte viridibus ; antennis apice valde dilatatis ; capite elongato, minute et sparse punctato, ad oculos paulo plicato ; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, minute et sparse punctato ; elytris thorace sat latioribus, elongatis, subparallelis, apice attenuatis, inspinosis, minute striato-punctatis, intervallis latis, deplanatis, parum punctatis. Long. 22 mill. ? Pérou. — Voisin de *punctulata* Pic, en diffère par la forme plus allongée et le prothorax moins finement ponctué.

C. sulcaticollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, viridi-æneus ; antennis rufo-æneis, apice nigris, sat dilatatis ; capite breve, minute et sparse punctato, oculis valde distantibus ; thorace minutissime punctato, breve et lato, lateraliter subarcuato, postice fortiter marginato et lateraliter sulcato, angulis posticis elevatis, fere rectis ; elytris thorace valde latioribus, lateraliter subsinuatis, apice attenuatis et vage cupreo-tinctis, ad humeros et post scutellum impressis, fere instriatis, antice sat fortiter et diverse lineato punctatis, postice minutissime punctatis. Long. 25 mill. Brésil. — Peut se placer près de *impressipennis* Geb., caractérisé surtout par la structure de son prothorax.

Le **C. subdilatata** mihi, du Brésil, se rapproche du précédent par sa coloration, mais l'avant-corps et le dessous sont en partie foncés et verdâtres, l'avant-corps est plus étroit et plus fortement ponctué, les élytres sont moins parallèles, un peu élargis après le milieu ♂, et bien

plus élargis ♀, les stries sont moins profondes. Les tibias du ♂ sont tous, mais diversement, arqués.

Pseudocyrtus subelongatus n. sp. Oblongo-elongatus, parum convexus, nitidus, infra nigro-cyanescens, supra olivaceo-ænescens; pedibus cyaneis, antennis nigris; capite thoraceque minute, parum et sparse punctatis, lateraliter late depressis, illo antice medio non marginato; scutello cyaneo; elytris thorace sat latioribus, lateraliter subsinuatis, apice subacuminatis, minutissime lineato-punctatis, lateraliter postice reducte carinatis, pro parte cyaneo marginatis. Long. 12 mill. Tonkin. — Diffère de *niasensis* Pic, en outre de la coloration, par la forme plus allongée, l'avant-corps moins large.

Cyriogetum pulchrum Pic (1927), préoccupé par *pulchrum* Pic (1926) devra prendre le nom de **perpulchrum**. — Le *C. pulchrum* Pic = *perpulchrum*, varie un peu de coloration; d'ordinaire, il est un peu verdâtre sur l'avant-corps, avec le devant de la tête, le dessous, avec les membres, plutôt noirs. Se distingue de *pulchrum* Pic par les épipleures de la coloration du reste des élytres qui ne sont pas, en outre, franchement pourprés, mais un peu teintés de reflets divers.

Plesiophthalmus ater n. sp. Oblongo-elongatus, niger, fere opacus; capite dense punctato, oculis distantibus; thorace breve et lato, lateraliter antice subarcuato, angulis anticis minutis, minute, lateraliter dense, medio parum sparse, punctato; elytris thorace valde latioribus, parum elongatis, apice attenuatis, minute striatis, sat fortiter punctatis, intervallis minute punctatis; femoribus posticis elytris non superantibus. Long. 15 mill. Chine: Yunnan. — Voisin de *Davidi* Frm., en diffère par la forme plus allongée, les élytres plus fortement ponctués, l'aspect moins mat.

Phaedis subparallelus n. sp. Oblongo-subparallelus, parum convexus, nitidus, nigro-piceus, supra æneo-olivaceus, elytris alterne viridi-olivaceis aut purpureis ; capite minute et sparse punctato, ad oculos distincte plicato ; thorace breve et lato, lateraliter fere recto, antice paulo attenuato, sat minute et sparse punctato, medio sulcatus ; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, apice attenuatis, fere instriatis, diverse, pro parte fortiter, lineato-punctatis ; pedibus sat validis, tibiis anticis ad basin curvatis. Long. 12 mill. Cochinchine. — Voisin de *cœruleopunctatus* Pic, en diffère par le prothorax moins court, la ponctuation plus forte et plus espacée des élytres et ces organes à couleurs alternées.

P. violaceipennis n. sp. Oblongus, convexus, nitidus, niger, vage olivaceus, elytris cupreo-violaceis, antennis nigris, validis ; capite thoraceque minutissime et sparse punctatis, illo breve et lato, lateraliter subarcuato, antice et postice sinuato ; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, postice attenuatis, humeris nullis, minute striato-punctatis, intervallis deplanatis, minutissime punctatis, his ad marginem vage viridibus, epipleuris obscuris ; pedibus sat robustis, tibiis anticis paulo curvatis. Long. 15 mill. Java. — Diffère de *javanus* Pic, par les élytres convexes, à stries de la couleur du fond, la dent des cuisses moins robuste, la tête à ponctuation plus fine.

P. diversicollis n. sp. Oblongo-subelongatus, subconvexus, nitidus, nigro metallicus, elytris olivaceis, capite thoraceque multi coloratis ; antennis nigris, ad basin sat gracilibus ; capite minute et sparse punctato, olivaceo, postice cupreo-tincto ; thorace breve et lato, lateraliter subarcuato, minute et sparse punctato, medio paulo nigro-subviolaceo, lateraliter olivaceo et cupreo tincto, intus parum distincte viride et purpureo lineato ; elytris thorace paulo latioribus, parum elongatis, apice attenua-

tis, humeris nullis, minute striato-punctatis, intervallis deplanatis, minutissime punctatis; pedibus parum robustis, tibiis anticis subrectis. Long. 14 mill. Java. — Diffère du précédent, en outre de la coloration, par les élytres moins convexes, la forme un peu moins robuste.

Antimachus simplex n. sp. ♂. Parum elongatus, subparallelus, nigro-piceus, labro testaceo, antennis pro parte, infra corpore pedibusque rufo-brunneis; capite sat fortiter et sparse punctato, cornu apice paulo dilatato et inciso; thorace sat breve et parum lato, antice medio breve et arcuate impresso, angulis anticis latis et subrotundatis, lateraliter subsinuato, sat fortiter et sparse punctato; elytris sat late lineato-punctatis, intervallis convexis; tibiis anticis apice dilatatis, non incis. Long. 12 mill. Brésil. — Espèce distincte, entre toutes, par le prothorax à angles antérieurs émoussés et la corne sans prolongements latéraux.

A. incisus n. sp. ♀. Elongatus, subparallelus, niger, infra corpore pedibusque paulo brunneis; capite supra inæquale, minute punctato; thorace parum elongato, medio longe et inæquale impresso, postice sulcato, lateraliter subsinuato, angulis anticis valde prominulis, apice subtruncatis, minute punctato; elytris lineato-punctatis, intervallis convexis. Long. 14 mill. Brésil. — Espèce caractérisée, à première vue, par la particulière structure de son prothorax. À placer près de *furcifer* Dalin.

A. furcifer v. nov. differens ♂. Diffère de la variété *reductus* Pic par le prothorax à angles antérieurs avancés, mais non en forme de corne et l'appendice céphalique à sommet triangulaire. Tibias antérieurs bidentés intérieurement avant leur extrémité. Brésil.

TABLE
POUR LE CINQUANTE-SIXIÈME FASCICULE

Nouveautés diverses.	Page 1
------------------------------	-----------

This book is a preservation facsimile produced for
the University of Illinois, Urbana-Champaign.

It is made in compliance with copyright law
and produced on acid-free archival
60# book weight paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper).

Preservation facsimile printing and binding

by

Northern Micrographics

Brookhaven Bindery

La Crosse, Wisconsin

2011

